

ملخص

دراسة الرعاية التغذوية لأوزان الولادة المنخفضة جدا

الكاتب: الدراما لاسينا

الكلمات الرئيسية: حليب الثدي ، وانخفاض وزن الولادة ، والمشاركة ، والأسر
كان الهدف العام لعملائنا هو القيام بدراسة حول الاداره التغذويه لأوزان المواليد المنخفضة جدا في بيئتنا

المواد والأساليب

ولتحقيق ذلك ، أجرينا دراسة عن الرضع الخدج الأقل من 1500 غرام لتقييم اثر الرضاعة الطبيعية في هذه الفئة من المواليد الجدد

دراسة تقييم مشاركته الأسر في رعاية المواليد الجدد في المستشفيات ؛ ثم جعل دوله المعرفة والممارسات من الأمهات عن تغذية أطفالهم من الولادة حتى سن 6 أشهر. واجري التحليل الإحصائي باستخدام إصدار برنامج SPSS 13.0 وتم الاحتفاظ بدرجة الاهميه الاحصائيه بالنسبة ل $p < 0.05$

النتائج: تراوحت اعمار الرضع الخدج من SA 28 إلى SA 36 في الإنتاج تراوحت الوزن من 1500 إلى 2250 غرام مع متوسط 1732 ± 42 ، وكان متوسط المكسب المطلق $19.9 \pm 2G/j$ ، وحجم تراوحت بين 39 إلى 44 سم ، وكان المكسب المطلق للحجم 0.11 سم/ي

وقد تم إطعام معظم الرضع الخدج بحليب الثدي أو قبل الحليب مع فيتامين د بالاضافه إلى الحديد من خلال مسبار المعدة الأورو. وجاء من الجزء الثاني ان الأمهات معظمهم من المشاركة (96.6%) (دون اي فرق بين مستوي التعليم مع متوسط عمر $29, 66 \pm 7, 17$

وقد مارست الرضاعة الطبيعية والمشاركة في النظام الغذائي من قبل 76.4% من الأمهات. تم الجلد علي الجلد من قبل 68 الأمهات أو 20.5%) (ولكن يحتاج إلى شرح ومساعدته من قبل المهنيين. التحق الجزء الثالث من دراستنا 78 الأمهات . وكان متوسط وقت التسليم عند الولادة 8 ± 2 ساعة. وكان الغذاء الأول الذي تلقاه الوليد هو حليب الثدي ل 66.7 في المائة من الأمهات ن). (52 = من بين العوامل التي تؤثر علي ممارسه الروح ، وكان وسط الاقامه) ع (0041 =

الاستنتاج: تعتمد نوعيه الحياة لهذا النظام علي الرابطة المبكرة للحمية الوريديه والمعوية القائمة علي حليب المراه المكمل والمتوازن .

للرضع الخدج تحت 1500g ، الرضاعة الطبيعية وحدها ليست كافية ، فانه ياخذ الحضور اليومي للأمهات من أجل ممارسه أكبر قدر ممكن من الثدي المرتبطة الجلد لمامسه الجلد.

التغذية الناجحة للطفل الذي يولد بوزن منخفض جدا ليست بسيطه ، والتقارب بين المهنيين وتحالف مع الاباء والأمهات هي الشروط الاساسيه التي لا غني عنها