



كلية الطب
والصيدلة - مراكش
FACULTÉ DE MÉDECINE
ET DE PHARMACIE - MARRAKECH

Année 2019

Thèse N°030

Pancréatite aiguë biliaire : nouvelles recommandations et place de la chirurgie

THESE

PRESENTEE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT LE 07/02/2019

PAR

Mr. Solaimane Kandri Rody

Né le 16 avril 1993 à Marrakech

POUR L'OBTENTION DU DOCTORAT EN MEDECINE

MOTS-CLES :

Pancréatite aiguë - lithiase biliaire - chirurgie - évolution

JURY

M. M.KHALLOUKI

Professeur agrégé en réanimation Anesthésie

PRESIDENT

Mr. R.BENELKHAIAT BENOMAR

Professeur de l'enseignement supérieur de Chirurgie Générale

RAPPORTEUR

Mme S.ALJ

Professeur agrégée de Radiologie.

Mr. Y.NARJIS

Professeur de Chirurgie Générale.

JUGES



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"رب أوزعني أن أشكر نعمتك
التي أنعمت عليّ وعلى والديّ
وأن أعمل صالحاً ترضاه
وأصلح لي في ذريّتي
إنّي تبنت إليك و إنّي من المسلمين"
صدق الله العظيم





Serment d'hippocrate

Au moment d'être admis à devenir membre de la profession médicale, je m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité.

Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur sont dus.

Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes malades sera mon premier but.

Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.


Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nobles traditions de la profession médicale.

Les médecins seront mes frères.

Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune considération politique et sociale, ne s'interposera entre mon devoir et mon patient.

Je maintiendrai strictement le respect de la vie humaine dès sa conception.

Même sous la menace, je n'userai pas mes connaissances médicales d'une façon contraire aux lois de l'humanité.





Liste des Professeurs



UNIVERSITE CADI AYYAD
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
MARRAKECH

Doyens Honoraires

: Pr. Badie Azzaman MEHADJI

: Pr. Abdelhaq ALAOUI YAZIDI

ADMINISTRATION

Doyen

: Pr. Mohammed BOUSKRAOUI

Vice doyen à la Recherche et la Coopération

: Pr. Mohamed AMINE

Vice doyen aux Affaires Pédagogiques

: Pr. Redouane EL FEZZAZI

Secrétaire Générale

: Mr. Azzeddine EL HOUDAIGUI

Professeurs de l'enseignement supérieur

Nom et Prénom	Spécialité	Nom et Prénom	Spécialité
ABKARI Imad	Traumato-orthopédie B	FINECH Benasser	Chirurgie - générale
ABOU EL HASSAN Taoufik	Anesthésie-réanimation	FOURAJI Karima	Chirurgie pédiatrique B
ABOULFALAH Abderrahim	Gynécologie-obstétrique	GHANNANE Houssine	Neurochirurgie
ABOUSSAIR Nisrine	Génétique	HAJJI Ibtissam	Ophtalmologie
ADERDOUR Lahcen	Oto- rhino- laryngologie	HOCAR Ouafa	Dermatologie
ADMOU Brahim	Immunologie	JALAL Hicham	Radiologie
AGHOUTANE El Mouhtadi	Chirurgie pédiatrique A	KHALLOUKI Mohammed	Anesthésie-réanimation
AIT BENALI Said	Neurochirurgie	KHATOURI Ali	Cardiologie
AIT BENKADDOUR Yassir	Gynécologie-obstétrique A	KHOUCHANI Mouna	Radiothérapie
AIT-SAB Imane	Pédiatrie	KISSANI Najib	Neurologie
AKHDARI Nadia	Dermatologie	KOULALI IDRISSEI Khalid	Traumato-orthopédie
AMAL Said	Dermatologie	KRATI Khadija	Gastro- entérologie
AMINE Mohamed	Epidémiologie-clinique	LAGHMARI Mehdi	Neurochirurgie
AMMAR Haddou	Oto-rhino- laryngologie	LAKMICHI Mohamed Amine	Urologie
AMRO Lamyae	Pneumo- phtisiologie	LAOUAD Inass	Néphrologie

ARSALANE Lamiae	Microbiologie – Virologie	LOUZI Abdelouahed	Chirurgie – générale
ASMOUKI Hamid	Gynécologie–obstétrique B	MADHAR Si Mohamed	Traumato–orthopédie A
ASRI Fatima	Psychiatrie	MAHMAL Lahoucine	Hématologie – clinique
BENCHAMKHA Yassine	Chirurgie réparatrice et plastique	MANOUDI Fatiha	Psychiatrie
BENELKHAIAT BENOMAR Ridouan	Chirurgie – générale	MANSOURI Nadia	Stomatologie et chiru maxillo faciale
BENJILALI Laila	Médecine interne	MOUDOUNI Said Mohammed	Urologie
BOUAITY Brahim	Oto–rhino–laryngologie	MOUTAJ Redouane	Parasitologie
BOUGHALEM Mohamed	Anesthésie – réanimation	MOUTAOUAKIL Abdeljalil	Ophtalmologie
BOUKHIRA Abderrahman	Biochimie – chimie	NAJEB Youssef	Traumato–orthopédie
BOUMZEBRA Drissi	Chirurgie Cardio–Vasculaire	NARJISS Youssef	Anesthésie–réanimation
BOURROUS Monir	Pédiatrie A	NEJMI Hicham	Rhumatologie
BOUSKRAOUI Mohammed	Pédiatrie A	NIAMANE Radouane	Oto rhino laryngologie
CHAFIK Rachid	Traumato–orthopédie A	NOURI Hassan	Radiologie
CHAKOUR Mohamed	Hématologie	OUALI IDRISSE Mariem	Chirurgie pédiatrique
CHELLAK Saliha	Biochimie– chimie	OULAD SAIAD Mohamed	Chirurgie générale
CHERIF IDRISSE EL GANOUNI Najat	Radiologie	RABBANI Khalid	Oto–rhino–laryngologie
CHOULLI Mohamed Khaled	Neuro pharmacologie	RAJI Abdelaziz	Traumato–orthopédie
DAHAMI Zakaria	Urologie	SAIDI Halim	Anesthésie–réanimation
EL ADIB Ahmed Rhassane	Anesthésie–réanimation	SAMKAOUI Mohamed Abdenasser	Gastro– entérologie
EL ANSARI Nawal	Endocrinologie et maladies métaboliques	SAMLANI Zouhour	Urologie
EL BOUCHTI Imane	Rhumatologie	SARF Ismail	Pédiatrie B

EL BOUIHI Mohamed	Stomatologie et chir maxillo faciale	SBIHI Mohamed	Microbiologie – virologie
EL FEZZAZI Redouane	Chirurgie pédiatrique	SORAA Nabila	Gynécologie–obstétrique A/B
EL HAOURY Hanane	Traumato–orthopédie A	SOUMMANI Abderraouf	Maladies infectieuses
EL HATTAOUI Mustapha	Cardiologie	TASSI Noura	Anesthésie–réanimation
EL HOUDZI Jamila	Pédiatrie B	YOUNOUS Said	Médecine interne
EL KARIMI Saloua	Cardiologie	ZAHLANE Mouna	Microbiologie
ELFIKRI Abdelghani	Radiologie	ZOUHAIR Said	Chirurgie générale
ESSAADOUNI Lamiaa	Médecine interne		

Professeurs Agrégés

Nom et Prénom	Spécialité	Nom et Prénom	Spécialité
ABOUCHADI Abdeljalil	Stomatologie et chir maxillo faciale	FADILI Wafaa	Néphrologie
ADALI Imane	Psychiatrie	FAKHIR Bouchra	Gynécologie–obstétrique A
ADARMOUCH Latifa	Médecine Communautaire (médecine préventive, santé publique et hygiène)	FAKHRI Anass	Histologie–embryologie cytogénétique
AISSAOUI Younes	Anesthésie – réanimation	GHOUNDALE Omar	Urologie
AIT AMEUR Mustapha	Hématologie Biologique	HACHIMI Abdelhamid	Réanimation médicale
AIT BATAHAR Salma	Pneumo–phtisiologie	HAROU Karam	Gynécologie–obstétrique B
ALAOUI Mustapha	Chirurgie–vasculaire périphérique	HAZMIRI Fatima Ezzahra	Histologie – Embryologie – Cytogénétique
ALJ Soumaya	Radiologie	IHBIBANE fatima	Maladies Infectieuses
ANIBA Khalid	Neurochirurgie	KAMILI El Ouafi El Aouni	Chirurgie pédiatrique B
ATMANE El Mehdi	Radiologie	KRIET Mohamed	Ophtalmologie
BAIZRI Hicham	Endocrinologie et maladies métaboliques	LAKOUICHMI Mohammed	Stomatologie et Chirurgie maxillo faciale
BASRAOUI Dounia	Radiologie	LOUHAB Nisrine	Neurologie

BASSIR Ahlam	Gynécologie– obstétrique A	MAOULAININE Fadl mrabih rabou	Pédiatrie (Neonatalogie)
BELBARAKA Rhizlane	Oncologie médicale	MATRANE Aboubakr	Médecine nucléaire
BELKHOUE Ahlam	Rhumatologie	MEJDANE Abdelhadi	Chirurgie Générale
BEN DRISS Laila	Cardiologie	MOUAFFAK Youssef	Anesthésie – réanimation
BENHIMA Mohamed Amine	Traumatologie – orthopédie B	MOUFID Kamal	Urologie
BENJELLOUN HARZIMI Amine	Pneumo– phtisiologie	MSOUGGAR Yassine	Chirurgie thoracique
BENLAI Abdeslam	Psychiatrie	OUBAHA Sofia	Physiologie
BENZAROUEL Dounia	Cardiologie	QACIF Hassan	Médecine interne
BOUCHENTOUF Rachid	Pneumo– phtisiologie	QAMOUISS Youssef	Anesthésie– réanimation
BOUKHANNI Lahcen	Gynécologie– obstétrique B	RADA Noureddine	Pédiatrie A
BOURRAHOUAT Aicha	Pédiatrie B	RAFIK Redda	Neurologie
BSISS Mohamed Aziz	Biophysique	RAIS Hanane	Anatomie pathologique
CHRAA Mohamed	Physiologie	RBAIBI Aziz	Cardiologie
DAROUASSI Youssef	Oto–Rhino – Laryngologie	ROCHDI Youssef	Oto–rhino– laryngologie
DRAISS Ghizlane	Pédiatrie	SAJIAI Hafsa	Pneumo– phtisiologie
EL AMRANI Moulay Driss	Anatomie	SEDDIKI Rachid	Anesthésie – Réanimation
EL BARNI Rachid	Chirurgie– générale	TAZI Mohamed Illias	Hématologie– clinique
EL HAOUATI Rachid	Chiru Cardio vasculaire	ZAHLANE Kawtar	Microbiologie – virologie
EL IDRISSE SLITINE Nadia	Pédiatrie	ZAOUI Sanaa	Pharmacologie
EL KHADER Ahmed	Chirurgie générale	ZEMRAOUI Nadir	Néphrologie
EL KHAYARI Mina	Réanimation médicale	ZIADI Amra	Anesthésie – réanimation
EL MGHARI TABIB Ghizlane	Endocrinologie et maladies métaboliques	ZYANI Mohammed	Médecine interne
EL OMRANI Abdelhamid	Radiothérapie		

Professeurs Assistants

Nom et Prénom	Spécialité	Nom et Prénom	Spécialité
ABDELFETTAH Youness	Rééducation et Réhabilitation Fonctionnelle	JALLAL Hamid	Cardiologie
ABDOU Abdessamad	Chiru Cardio vasculaire	JANAH Hicham	Pneumo- phtisiologie
ABIR Badreddine	Stomatologie et Chirurgie maxillo faciale	KADDOURI Said	Médecine interne
AKKA Rachid	Gastro – entérologie	LAFFINTI Mahmoud Amine	Psychiatrie
ALAOUI Hassan	Anesthésie – Réanimation	LAHKIM Mohammed	Chirurgie générale
AMINE Abdellah	Cardiologie	LALYA Issam	Radiothérapie
ARABI Hafid	Médecine physique et réadaptation fonctionnelle	LOQMAN Souad	Microbiologie et toxicologie environnementale
ARSALANE Adil	Chirurgie Thoracique	MAHFOUD Tarik	Oncologie médicale
ASSERRAJI Mohammed	Néphrologie	MARGAD Omar	Traumatologie – orthopédie
BAALLAL Hassan	Neurochirurgie	MILOUDI Mohcine	Microbiologie – Virologie
BABA Hicham	Chirurgie générale	MLIHA TOUATI Mohammed	Oto-Rhino – Laryngologie
BELARBI Marouane	Néphrologie	MOUHSINE Abdelilah	Radiologie
BELBACHIR Anass	Anatomie– pathologique	MOUNACH Aziza	Rhumatologie
BELFQUIH Hatim	Neurochirurgie	MOUZARI Yassine	Ophtalmologie
BELGHMAIDI Sarah	OPhtalmologie	NADER Youssef	Traumatologie – orthopédie
BELHADJ Ayoub	Anesthésie – Réanimation	NADOUR Karim	Oto-Rhino – Laryngologie
BENNAOUI Fatiha	Pédiatrie (Neonatalogie)	NAOUI Hafida	Parasitologie Mycologie
BOUCHENTOUF Sidi Mohammed	Chirurgie générale	NASSIM SABAH Taoufik	Chirurgie Réparatrice et Plastique
BOUKHRIS Jalal	Traumatologie – orthopédie	NYA Fouad	Chirurgie Cardio – Vasculaire

BOUZERDA Abdelmajid	Cardiologie	OUEIAGLI NABIH Fadoua	Psychiatrie
CHETOUI Abdelkhalek	Cardiologie	REBAHI Houssam	Anesthésie – Réanimation
EL HARRECH Youness	Urologie	RHARRASSI Isam	Anatomie– patologique
EL KAMOUNI Youssef	Microbiologie Virologie	SALAMA Tarik	Chirurgie pédiatrique
EL MEZOUARI El Moustafa	Parasitologie Mycologie	SAOUAB Rachida	Radiologie
ELBAZ Meriem	Pédiatrie	SEBBANI Majda	Médecine Communautaire (médecine préventive, santé publique et hygiène)
ELQATNI Mohamed	Médecine interne	SERGHINI Issam	Anesthésie – Réanimation
ESSADI Ismail	Oncologie Médicale	TAMZAOURTE Mouna	Gastro – entérologie
FDIL Naima	Chimie de Coordination Bio– organique	TOURABI Khalid	Chirurgie réparatrice et plastique
FENNANE Hicham	Chirurgie Thoracique	YASSIR Zakaria	Pneumo– phtisiologie
GHAZI Mirieme	Rhumatologie	ZARROUKI Youssef	Anesthésie – Réanimation
GHOZLANI Imad	Rhumatologie	ZIDANE Moulay Abdelfettah	Chirurgie Thoracique
HAMMI Salah Eddine	Médecine interne	ZOUIZRA Zahira	Chirurgie Cardio– Vasculaire
Hammoune Nabil	Radiologie		

LISTE ARRÊTÉE LE 12/07/2018



Dédicaces



« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur ; elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries »

Marcel Proust.



Je me dois d'avouer pleinement ma reconnaissance à toutes les personnes qui m'ont soutenue durant mon parcours, qui ont su me hisser vers le haut pour atteindre mon objectif. C'est avec amour, respect et gratitude que

Je dédie cette thèse ... 

الله

*Louange à Dieu tout puissant,
qui m'a permis de voir ce jour tant attendu.*

A ma chère mère Sabah

Des mots ne pourront jamais exprimer la profondeur de mon amour et mon affection.

A toi maman, je dédie ce travail, qui sans ton soutien et ton amour, n'aurait pu voir le jour.

Tes qualités humaines exceptionnelles font de toi une mère exemplaire et un modèle de vertu. Tes prières ont été pour moi un grand soutien moral au long de mes études.

J'espère que tu trouveras, chère mère, dans ce travail le fruit de ton dévouement et de tes sacrifices ainsi que l'expression de ma gratitude et de mon profond amour.

Puisse Dieu te préserver des aléas de la vie et te procurer longue vie afin que je puisse à mon tour te combler.

A mon cher père Abdelilah

Tu as été et tu resteras toujours un exemple pour moi par tes qualités humaines, ta persévérance et ton perfectionnisme.

Ta bonté, ta tendresse et ta générosité sont sans limites.

Tes prières ont été pour moi d'un grand soutien moral tout au long de mes études. Aucun mot, aucune dédicace ne saurait exprimer mon respect, mon amour éternel et ma considération pour les sacrifices que tu as consenti pour mon éducation et mon bien être.

Je souhaite que cette thèse t'apporte la joie de voir aboutir tes espoirs et j'espère avoir été digne de ta confiance.

Puisse Dieu te garder et te procurer santé et longue vie.

A ma sœur Zineb

Tous les mots ne suffiront pas pour exprimer ma gratitude pour tes encouragements, ton soutien et ta présence à mes côtés au moment difficile.

Que Dieu te bénisse.

A son époux Othmane qu'on a eu beaucoup de chance de le connaître ainsi que sa famille et l'amour de la famille Ismaïl

Je vous aime.

A mon frère Mohamed

Je te dédie ce travail, en guise de reconnaissance de ton amour, de ta compréhension et de ta générosité avec tous mes vœux de bonheur et de réussite

A ma sœur Kenza

Ma sœur je te le dis je te le crie je te l'affirme: tu n'es pas tout le monde tu es mon monde. Pour Toi ma sœur qui occupe une place unique dans ma vie. Je t'offre cette pensée pour confirmer toute l'importance que tu as à mes yeux. On a vécu une enfance merveilleuse qui restera gravée dans mon cœur.

A son époux Ahmed un vrai homme que dieu te bénisse ainsi que ta famille

A ma grand-mère Mamalaïini

Qui m'a accompagné par ses prières, douceur, amour, puisse dieu lui prêter longue vie et beaucoup de santé et de bonheur.

A la mémoire de mes grands-pères et ma grand-mère

*J'aurais tant aimé que vous soyez présent.
Que dieu ait vos âmes dans sa sainte miséricorde.*

A la mémoire de mon oncle Mohamed

Que dieu ait ton âme dans sa sainte miséricorde.

A mes chers oncles(Abdelmalek, Samir, Saïd, Abdelmouman, Rachid, Omar), tantes(Bouchra, Laïla, Achouak, Imane, Samia, Houria), leurs époux et épouses

A mes chers cousins et cousines

En témoignage de mon attachement et de ma grande considération. J'espère que vous trouverez à travers ce travail l'expression de mes sentiments les plus chaleureux. Que ce travail vous apporte l'estime, et le respect que je porte à votre égard, et soit la preuve du désir que j'ai depuis toujours pour vous honorer. Tous mes vœux de bonheur et de santé.

A mes amis

*Avec qui j'ai partagé des moments fous
Merci pour votre soutien et votre amour
C'est grâce à vous que j'ai trouvé le courage de continuer,
C'est grâce à vous que je suis devenu ce que je suis.*

Je dédie ce travail.



Remerciements



A notre maître et président de thèse:

*M.KHALLOUKI Professeur agrégé en réanimation Anesthésie du CHU
Mohammed VI- MARRAKECH*

Je suis très sensible à l'honneur que vous m'avez fait en acceptant aimablement de présider mon jury de thèse. Nous avons eu le grand privilège de bénéficier de votre enseignement lumineux durant nos années d'étude. Nous vous sommes profondément reconnaissant, Veuillez cher maître, trouver dans ce travail, le témoignage de ma gratitude, ma haute considération et mon profond respect

A notre maître et rapporteur de thèse:

*Professeur R. BENELKHAIA BENOMAR Professeur de l'enseignement
supérieur de Chirurgie Générale
Hôpital ibn tofaïl - MARRAKECH*

C'est avec un grand plaisir que je me suis adressé à vous dans le but de bénéficier de votre encadrement et j'étais très touchée par l'honneur que vous m'avez fait en acceptant de me confier ce travail.

Merci pour m'avoir guidé tout au long de ce travail. Merci pour l'accueil aimable et bienveillant que vous m'avez réservé à chaque fois.

Veuillez accepter, cher maître, dans ce travail l'assurance de mon estime et de mon profond respect. Vos qualités humaines et professionnelles jointes à votre compétence et votre dévouement pour votre profession seront pour moi un exemple à suivre dans l'exercice de cette honorable mission.

A notre maître et juge de thèse:

S.ALI

Professeur agrégée de Radiologie.

Vous avez accepté très spontanément de faire partie de notre jury. Nous vous remercions de votre enseignement et de l'intérêt que vous avez porté à ce travail.

Veuillez trouver ici, Professeur, l'expression de notre profond respect.

A notre maître et juge de thèse:

V.NARJIS

Professeur de Chirurgie Générale.

Veuillez accepter Professeur, mes vifs remerciements pour l'intérêt que vous avez porté à ce travail en acceptant de faire partie de mon jury de thèse. Veuillez trouver ici, chère Maître, l'assurance de mes sentiments respectueux et dévoués.

A tous ceux qui ont contribué de près ou de loin

à la réalisation de ce travail.

*



Liste des Abréviations



LISTE DES ABRÉVIATIONS

AE	: alimentation entérale
ALI	: acute lung injury
ASP	: abdomen sans préparation
CHU	: centre hospitalier universitaire
CP	: cholangite primitive
CPRE	: cholango pancréatographie rétrograde endoscopique
CRP	: protéine C réactive
DDS	: décontamination digestive sélective
IPP	: Inhibiteur de pompes à protons
IRM	: Imagerie de résonance magnétique
FKP	: fistule kysto pancréatique
HTA	: hypertension artérielle
NFS	: numération formule sanguine
PAN	: pancréatite aigue nécrotique
PA NH	: pancréatite aigue nécrotico hémorragique
PAO	: pancréatite aigue oedemateuse
SDRA	: syndrome de détresse respiratoire aigue
SRIS	: syndrome de réponse inflammatoire systémique
VNI	: ventilation non invasive



Plans



INTRODUCTION	1
PATIENTS ET METHODES	3
RESULTATS	5
I. EPIDEMIOLOGIE	6
1. âge	6
2. sexe	6
II. DONNEES CLINIQUES	7
1. Antécédents	7
2. Signes clinique	8
3. examen clinique	10
III. DONNEES PARACLINIQUES :	11
1. Biologie	11
2. Imagerie	11
3. classification scannographique	13
IV. PRISE EN CHARGE	17
1. Traitement médical	17
2. Traitement chirurgical	17
V. Surveillance	19
1. Lieu de surveillance	19
2. Moyens de surveillance	19
VI. EVOLUTION	19
DISCUSSION	21
I. INTRODUCTION	22
II. Rappel anatomique	24
1. Rapports topographiques du pancréas	26
2. Vascularisation et drainage lymphatique du pancréas	29
III. Physiopathologie	31
IV. Anatomie pathologie	34
1. La pancréatite oedémateuse	34
2. La pancréatite nécrosante	34
V. Données démographiques et épidémiologiques	35
1. Fréquence	35
2. Age	35

3. Sexe	36
VI. Diagnostic positif	37
1. Clinique	37
2. Diagnostic biologique	38
3. Imagerie	39
VII. Diagnostic de gravité	46
1. Score bioclinique	46
2. Index de sévérité TDM	49
VIII. DIAGNOSTIC DE L'ORIGINE BILIAIRE DE LA PANCREATITE AIGUË	50
1. Arguments cliniques	50
2. diagnostic biologique	52
3. Diagnostic radiologique	54
IX. DIAGNOSTIC DE GRAVITE	57
1. score de Ranson	57
2. Scores de Balthazar	57
3. Défaillance multi viscérale	59
4. les autres scores de gravité : nous citons	59
X. Traitement	60
1. TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE	60
2. Traitement curatif	71
CONCLUSION	88
RESUMES	90
BIBLIOGRAPHIE	94



Introduction



La pancréatite aiguë (PA) biliaire est une agression majeure du pancréas mimant les états septiques.

Elle résulte de la migration de petits calculs, de cristaux biliaires et l'obstruction parfois transitoire de la voie biliaire principale (VBP) . Cette lithiase biliaire est la cause la plus fréquente des pancréatites aiguës.

Le diagnostic positif repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques. Les performances des nouvelles méthodes d'imagerie notamment l'écho endoscopie et la cholangio-IRM apportent actuellement des arguments pertinents en faveur de l'origine biliaire des PA.

La gravité de la PA est définie par l'existence d'une défaillance d'organes et/ou par la survenue d'une complication locale. Elle est associée à une mortalité considérable. Les éléments d'appréciation de la gravité du pronostic doivent permettre de sélectionner et d'orienter les malades graves.

La prise en charge thérapeutique comporte un volet médical, endoscopique et chirurgical. Dans une grande partie des cas, l'évolution des pancréatites aiguës biliaires est favorable, avec un risque de récurrence à moyen et à long terme en l'absence de traitement.

Le but de notre travail est d'essayer de mettre le point sur la prise en charge globale et particulièrement chirurgicale de la pancréatite aigue d'origine biliaire avec l'avènement des recommandations et l'impact de leur application sur le pronostic.



Patients et méthodes



I. MATERIEL :

Notre étude est de type rétrospective de 54 cas traités pour pancréatite aigue biliaire au sein du service de chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI sur une période d'un an allant du janvier à décembre 2017.

Critères d'inclusion :

- ✓ pancréatite aigue d'origine biliaire

Critères d'exclusion :

- ✓ Pancréatite aigue non biliaire
- ✓ Dossiers non exploitables

II. METHODES :

1. Collecte des données :

La collecte des données était réalisée grâce à une fiche d'exploitation qui contenait les données :

- Epidémiologiques
- Cliniques
- Paracliniques
- Thérapeutiques
- Et évolutives .

2. analyse des données :

L'analyse des données était réalisée grâce au logiciel EXCEL 2010.



Résultats



I. EPIDEMIOLOGIE :

1. âge :

Dans notre série, l'âge moyen est de 48,3ans avec des extrémités allant de 28ans à 75ans.

4 cas étaient agés entre 20 et 30 ans (7%), 9 cas étaient agés entre 31 et 40 ans (17%), 18 cas étaient agés entre 41 et 50 ans (33%), 13 cas étaient agés entre 51 et 60 ans (24%), 10 cas étaient agés de plus de 60 ans (19%).




Figure 1: répartition selon l'âge

2. sexe :

Dans notre étude les hommes représentaient 10 cas ((19%), les femmes représentaient 44 cas (81%)




Figure 2: répartition selon le sexe

II. DONNEES CLINIQUES :

1. Antécédents :

Dans cette étude, concernant les antécédents médicaux, 8 cas avaient un diabète (14.8%) , 9 cas étaient atteints d'une HTA (16.6%), 3 cas avaient un antécédent de tuberculose pulmonaire (5.5%), l'hypothyroïdie concernait 2 cas (3.7%), épilepsie était présente une seule fois dans 1 cas (1.8%), 9 cas avaient un antécédent toxique qui est le tabac (17%), et 5 cas alcoolique chronique (9.2%)

Concernant les antécédents chirurgicaux, 45 cas avaient une lithiase urinaire (83.3%), 11 cas étaient opérés pour cholecystéctomie (20.3%), 1 cas avait une tumeur du rein droit (1.8%), 6 cas ont été opérés avant pour appendicectomie

Tableau I : répartition selon les antécédents.

Antécédents médicaux	Pourcentage	Antécédents chirurgicaux	Pourcentage
Diabète	14.8%	Lithiase urinaire	83.3%
HTA	16.6%	Cholecystéctomie	20.3%
Tuberculose pulm	5.5%	Tumeur rein droit	1.8%
Hypothyroïdie	3.7%	Appendicectomie	11.1%
Epilepsie	1.8%		
Tabac	17%		
Alcool	9.2%		

2. Signes clinique :

2.1 Délai de la symptomatologie :

Le délai d'apparition des signes cliniques est entre 2heures a 24heures avec un délai moyen de 13h.

2.2 signes généraux :

Dans cette étude, la fièvre était présente chez 45 cas (83.3%), et 10 cas avaient une altération de l'état général (18.5%).




Figure 3: répartition selon les signes généraux .

2.3 Signes digestifs :

Dans cette série , tous les cas avaient une douleur (100%), 49 cas avaient une douleur épigastrique (90.7%), la douleur dorsale chez un seul cas (1.8%), 4 cas avaient une douleur diffuse (7.4%), 40 cas avaient des vomissements (74%), 3 cas avaient un antécédent de trouble de transit :arrêt des matières et des gaz (5.5%).




Figure 4: répartition selon les signes fonctionnels.

3. examen clinique :

Dans notre étude, 8 cas avaient un ictère ou sub-ictère (14.8%) , 52 cas avaient une sensibilité épigastrique (96.3%), 7 cas avaient une douleur localisée ou diffuses (13%) et 3 cas avaient un météorisme (5.5%)




Figure 5: répartition selon les données de l'examen clinique.

III. DONNEES PARACLINIQUES :

1. Biologie :

Dans notre étude , la lipasémie supérieur à 3 fois la normale était objectivée chez 48 cas (88.8%),une cholestase hépatique était objectivée chez 28 cas (51.8%), cytolysse hépatique chez 12 cas (22.2%) et 18 cas parmi les 46 cas prélevés avaient une CRP positive (39.1%)




Figure 6: répartition selon les résultats de l'examen biologique.

2. Imagerie :

a) échographie :

L'échographie a été réalisée chez tous les malades (100%), une lithiase vésiculaire visible simple chez 31 cas (57.40%), une cholécystite chez 4 cas (13%) et une angiocholite chez 2 cas (3.70%), Dilatation VBP + VBIH retrouvée chez 10 cas (5.4%)




Figure 7: répartition selon les résultats de l'échographie abdominale.

b) Tomodensitométrie :

La TDM a été réalisée chez tous les cas (100%), 41 cas avaient un pancréas augmenté de volume (76%), chez 13 cas une coulée de nécrose était présente (24%), 38 cas montraient la présence d'une lithiase simple (57.40%), une cholécystite chez 4 cas (13%) et une angiocholite chez 2 cas (3.70%).




Figure 8: répartition selon les données de la TDM abdominale.

3. classification scannographique :

Dans notre étude, le stade A de la pancréatite était présent chez 2 cas (3.7%), le stade B chez 16 cas (29.6%), le stade C retrouvé chez 23 cas (42.5%), le stade D chez 9 cas (16.6%), le stade D chez 9 cas (16.6%), le stade E chez 4cas (7.4%).




Figure 9: répartition selon la classification scannographique .



Figure 10: Classification Balthazar a la TDM, stadeA aspect normal du pancréas.



Figure 11: Classification Balthazar au TDM : Stade B : Infiltration de la glande pancréatique



Figure 12: Classification Balthazar au TDM : Stade C : densification de la graisse péri pancréatique




Figure 13: Classification Balthazar au TDM : Stade D : Une coulée de nécrose



Figure 14: Classification Balthazar au TDM : Stade E : Plusieurs coulées de nécrose

+La bili-irm réalisée chez 3 cas dont 2 cas ont une dilatation de la voie biliaire principale et 1 cas d'une femme enceinte qui a revele :

Des lithiases multiples chez les deux cas de dilatation de la VBP et des microlithiases du bas cholédoque chez la femme enceinte.



Figure 15 :Bili-irm montrant la dilatation des voies biliaires

IV. PRISE EN CHARGE :

1. Traitement médical :

Tous les malades ont bénéficiés d'un équilibre hydro-électrolytique, antalgique, antispasmodique, IPP et une arrêt de l'alimentation.

Une sonde naso gastriqueréalisée chez 5 cas (9.2%).

Une alimentation parentérale chez 19 cas (35%).

18 cas ont reçus une insulinothérapie (33.3%), 8 cas diabétique et 10 cas non diabétique.

L'antibiothérapie a été administrée chez les 10 cas ayant une altération de l'état générale (18.5%).

12 cas ont reçu un anticoagulant (22.2%)

2. Traitement chirurgical :

2.1 voie d'abord :

Dans cette série, 38 cas ont été opérés pour cholécystectomie (70.6%), 30 cas par coelioscopie (79%) et 8 cas par voie sous costale (21%).

2.2 gestes chirurgicaux :

2.2-1 chirurgie biliaire :

Le traitement chirurgical a été indiqué chez tous les patients porteur d'une pancréatite classé A, B ou C au cours de la même hospitalisation après refroidissement de celle-ci soit 41 patients (76%) avec un délai moyen d'intervention de 6 jours.

Le traitement chirurgical a été indiqué chez les patients porteurs d'une PA stade D et E 5 à 6 semaines après refroidissement de celle-ci soit 13 patients (24%).

Le drainage du cholédoque a été pratiqué chez 10 cas (18.5%), 1 cas a reçu un drainage duodéno pancréatique (1.8%), le drain de kehr chez 7 cas (13%), 2 cas ont fait une sphinctérectomie endoscopique (3.7%).

2.2-2 Chirurgies du FKP:

2 patients (3.7%) ont bénéficié d'un traitement chirurgical indiqué devant la survenue de complications locales à savoir le pseudo kyste du pancréas :

Le geste chirurgical a consisté en une dérivation kysto-gastrique.

Tableau II : répartition selon les gestes chirurgicaux.

Type de chirurgie		Pourcentage
Chirurgie biliaire	cholecystéctomie	70.6%
	Drainage du cholédoque	18.5%
	Dérivation duodéno pancréatique	1.8%
	Drain de kehr	13%
	Sphinctérectomie endoscopique	3.7%
Dérivation kysto-gastrique		3.7%

V. Surveillance :

1. Lieu de surveillance :

Le traitement de nos patients a été guidé par une surveillance stricte au sein du service de chirurgie générale.

2. Moyens de surveillance :

- ✓ La clinique : un examen clinique a été effectué quotidiennement avec une surveillance horaire de la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température, la diurèse, l'état de conscience, la glycémie par DEXTRO (surveillance horaire) et surveillance du Redon.
- ✓ La biologie : par l'hémogramme, l'ionogramme sanguin, la CRP et la lipasémie.

VI. EVOLUTION :

1. **L'évolution précoce** a été marqué par une disparition de la douleur chez tous les patients en utilisant des antalgiques paliers 1, 2A ou 2B chez 49 cas (88.9%), avec recours à la morphine chez 6 patients (11.1%).
2. **L'évolution tardive** a été favorable chez 44 patients (81.5%). Les complications ont été notées chez le reste, 2 cas de défaillance viscérale (3.7%), 2 cas de pseudokyste (3.7%), 1 cas d'infection et de coulée de nécrose (1.8%), une récurrence chez 3 cas (5.5%), la mortalité de 2 cas (3.7%) par état de choc septique ou décompensation de diabète.




Figure 16: répartition selon les données d'évolution.



Discussion



I. INTRODUCTION

La pancréatite aigüe (PA) est un processus inflammatoire aigue du pancréas lié à une autodigestion de la glande par ses propres enzymes très puissantes [1,2]. Elle pose peu de problèmes diagnostiques, mais la recherche de son étiologie peut être délicate. Cette enquête est importante tant pour le traitement de la poussée actuelle que pour la prévention de sa récurrence. Il est admis que la lithiase biliaire représente l'étiologie la plus fréquente des PA dans notre contexte.

Selon le degré et l'étendue de l'inflammation, on distingue deux formes de PA de gravité variable :

La pancréatite aigue nécrotico-hémorragique (PANH) : c'est la forme grave. Elle correspond à une PA associée à une défaillance d'organe et/ou à des Complications locales à type de nécrose (avec infection) d'abcès ou de pseudo-kyste. Elle est d'évolution imprévisible et engage le pronostic vital(5)

La pancréatite aigüe œdémateuse (PAO) : La forme la plus fréquente (80 à 85%). Elle correspond à un aspect turgescent, œdémateux et friable du pancréas. Elle est généralement d'évolution bénigne.

Récemment, il a été proposé un troisième groupe de PA définies comme des formes avec complication, mais sans mortalité, il s'agit de PA dites « modérément sévères » selon la traduction littérale anglaise. Cette forme n'est pas encore validée par toutes les équipes et n'est pas encore utilisée en pratique

Il est admis que la lithiase biliaire représente la cause la plus fréquente de pancréatite aigue (plus de 40% dans notre contexte) ; le plus souvent, elle est secondaire à une hyperpression dans l'ampoule de Vater, avec reflux du liquide digestif dans le canal de Wirsung.

Une meilleure compréhension de la physiopathologie de la PA qui reste complexe et mal connue, a permis d'améliorer le traitement et le pronostic des formes graves de la PA [3, 4, 5]. La tomодensitométrie (TDM) s'est imposée comme la meilleure technique actuelle dans l'étude des PA en facilitant le diagnostic, en contribuant à l'évaluation du pronostic, en assurant la meilleure évolutive à la recherche de complications et en guidant certains gestes de radiologie conventionnelle. Le diagnostic positif de la PA est assuré par l'association de donnée cliniques, d'une douleur abdominale épigastrique, et une augmentation forte de l'amylasémie et/ou de la lipasémie, de l'élimination d'autres causes d'abdomen aigue avec augmentation des enzymes pancréatiques sériques, et la démonstration des lésions pancréatiques et/ou péripancréatiques au scanner [5].

Le diagnostic positif d'une PAB est posé par au minimum une échographie biliaire et un dosage des transaminases en plus du dosage des enzymes pancréatiques. Simultanément, la gravité initiale est évaluée sur les données cliniques, biologiques et morphologiques, particulièrement aux scores les plus utilisés (APATCH II et RANSON pour les scores clinico-biologiques, BALTHAZAR pour les scores morphologiques). L'appréciation initiale de la gravité permet de décider de la meilleure orientation du malade (soins intensifs ; chirurgie).

La majorité des pancréatites aiguës sont oedémateuses et régressent sans séquelles. Quant aux formes graves nécrosantes, elles sont responsables de décès, de défaillances viscérales et de complications intra abdominales ; Les complications générales précoces : (hypovolemie, insuffisance cardiaque ; rénale et respiratoire) et locorégionales tardives (nécrose surinfectée, faux kystes, fistules, perforation, hémorragie) [2].

Le traitement est plus souvent médical (aspiration digestive, réanimation, antalgiques, antibiotiques adaptés, drainage percutané) que chirurgical (drainage ; nécrosectomie). Le traitement spécifique de la PA biliaire est la cholécystectomie et/ou sphinctérotomie endoscopique [4,5].

Le but de notre travail est d'essayer de donner un éclairage sur : Les nouvelles recommandations du traitement de la pancréatite aigue biliaire La place de la chirurgie dans le traitement

Notre travail constitue une étude rétrospective de 35 cas de PAB traitées au service de chirurgie viscérale de l'hôpital ibn tofail de marrakech durant une période de 1an allant de janvier 2017 à decembre 2017.

II. Rappel anatomique :

La connaissance de l'anatomie du pancréas et des structures de voisinages revêt un intérêt capital dans la compréhension de la physiopathologie des PAN ainsi que les applications des différents moyens thérapeutiques.

Le pancréas est un organe rétro-péritonéal situé à cheval sur les étages sus et sous-mésocolique, il est situé en regard de L1-L2. Il a un aspect macroscopique allongé, irrégulier, gris rosâtre et de consistance ferme mais friable.

On distingue au pancréas trois parties (Figure 4) :

- La tête : volumineuse et renflée, elle est partiellement encadrée par les quatre portions du duodénum.
- Le corps : réuni la tête et le col.
- La queue : est une extrémité mince et mobile creusée d'une gouttière par les vaisseaux spléniques.
- Deux canaux excréteurs drainent les sécrétions exocrines du pancréas dans le deuxième duodénum : L'un principal (Wirsung) et l'autre accessoire (Santorini).




Figure 17 : Vue antérieure schématique montrant la configuration générale du pancréas [6]




Figure 18: Les différents canaux du carrefour biliopancréatique

1. Rapports topographiques du pancréas [7]:

1.1 La tête du pancréas :

1.1-2 La face antérieure :

La face antérieure du pancréas est croisée par la racine du mésocôlon transverse. Au-dessous du péritoine, la face antérieure de la tête est directement en rapport avec (figure 5):

- Les vaisseaux mésentériques supérieurs ;
- L'artère gastroduodénale et ses branches de division. Par l'intermédiaire du péritoine, la tête est en rapport avec le côlon transverse et avec la portion pylorique de l'estomac.

1.1-3 La face postérieure :

Elle est directement en rapport avec le canal cholédoque et les rameaux postérieures des artères pancréatico-duodénales. Elle répond encore à la veine porte, puis à la veine cave inférieure dont elle est séparée par la lame de Treitz. Par son pourtour, la tête du pancréas répond aux quatre portions du duodénum.

1.2 Le col :

A sa partie supérieure, il répond à la première portion du duodénum. Sa partie inférieure répond aux vaisseaux mésentériques supérieurs. Sa face antérieure est recouverte par le pylore et la portion antrale de l'estomac.

1.3 Le corps :

1.3-1 La face antérieure :

Elle est en rapport par l'intermédiaire de l'arrière cavité des épiploons (ACE) avec la face postérieure de l'estomac.

1.3-2 La face postérieure :

Elle est creusée de deux sillons l'un supérieure livre passage à l'artère splénique et l'autre inférieure ou chemine la veine splénique. Elle est croisée par la veine mésentérique inférieure.

1.3-4 Le bord inférieur :

Il est en rapport avec la racine du mésocôlon transverse.

1.4 a queue du pancréas :

Elle est soit en contact avec la face médiane de la rate, soit reliée à la rate par l'épiploon pancréatico-splénique qui contient les vaisseaux spléniques.




Figure 20: Coupe transversale passant par le pancréas [8]

2. Vascularisation et drainage lymphatique du pancréas :

2.1 Les artères :

Les artères du pancréas sont représentées par [7,9] (Figure 7) :

- ❖ Les artères pancréatico-duodénales droites supérieures et inférieures, branche de l'artère gastro-duodénale ;
- ❖ L'artère pancréatico-duodénale gauche, branche de l'artère mésentérique supérieure ;
- ❖ Les rameaux pancréatiques de l'artère splénique ;
- ❖ L'artère pancréatique inférieure, branche de l'artère mésentérique supérieure.

2.2 Les veines :

Les veines suivent en général le trajet des rameaux artériels. Tout le sang veineux du pancréas est déversé dans la veine porte, par l'intermédiaire :

- ❖ Des veines spléniques ;
- ❖ Des veines mésentériques supérieures ;
- ❖ Des veines pancréatico-duodénales supérieures.

2.3 Les lymphatiques :

Les vaisseaux lymphatiques du pancréas aboutissent :

- ❖ Aux ganglions de la chaîne splénique ;
- ❖ Aux ganglions rétro-pyloriques, sous-pyloriques, duodéno-pancréatiques antérieures et postérieures de la chaîne hépatique ;
- ❖ Aux ganglions de la chaîne mésentérique supérieure ;
- ❖ Enfin les ganglions juxta aortiques, parfois même aux ganglions du mésocôlon transverse.




Figure 21: Vue antérieure du pancréas montrant la disposition des artères pancréatique [8].

III. Physiopathologie :

Les mécanismes physiopathologiques de la PA sont obscurs, et repose sur deux théories probablement associées : la théorie canalaire et la théorie acineuse [10]. Selon ces deux théories, la PA serait due à des perturbations du métabolisme cellulaire et à une activation enzymatique avec hyperstimulation du pancréas.

Trois facteurs principaux semblent impliqués dans la constitution d'une nécrose pancréatique :

- ✓ autodigestion de la glande pancréatique ;
- ✓ stimulation excessive des cellules pro-inflammatoires ;
- ✓ phénomènes vasculaires.

Quelle que soit l'étiologie de la pancréatite, le phénomène initiateur de la maladie semble bien se situer au sein même de la cellule acineuse (Figure 1 et 2). En effet, ces cellules contiennent sous forme de zymogènes des enzymes protéolytiques (trypsinogène) ou lipolytiques (phospholipase A2) et sous forme de lysosomes des hydrolases comme la cathepsine B. L'atteinte cellulaire induit la colocalisation des protéases inactives avec les hydrolases lysosomales, ce qui provoque une activation prématurée des enzymes avec exocytose pathologique des zymogènes dans l'espace interstitiel. Or, il n'existe à l'état normal dans le suc 8 pancréatique que de faibles quantités d'inhibiteurs spécifiques de la trypsine ou non spécifiques comme l'alpha-2-macroglobuline, insuffisantes pour neutraliser cette libération massive [11, 12]. L'activation en cascade des proenzymes (trypsinogène – chymotrypsinogène – proélastase – prophospholipase) induit une réponse de la cellule acineuse qui accentue l'atteinte cellulaire et provoque un recrutement de l'ensemble des leucocytes et des cellules endothéliales au sein même de la glande pancréatique. Cette réponse inflammatoire locale va engendrer la production excessive de médiateurs de l'inflammation tels

que l'interleukine 1 (IL1), l'IL6 et l'IL8. Le niveau de tumor necrosis factor (TNF- α) relargué par les macrophages de la glande pancréatique est parfaitement corrélé à la sévérité de l'atteinte lors de pancréatite expérimentale. Un niveau élevé de stress oxydant avec altération de la microcirculation au niveau pancréatique et augmentation de la perméabilité vasculaire et feedback neurogène contribue également à la sévérité de l'atteinte[13]. La mort cellulaire survient par apoptose, voire nécrose dans les cas les plus sévères. Cette atteinte locale s'accompagne d'un syndrome inflammatoire plus ou moins intense et prolongé accompagné d'autres manifestations systémiques pouvant conduire à une défaillance multiviscérale : défaillance cardiovasculaire, détresse respiratoire aiguë, coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), insuffisance rénale aiguë.

L'ensemble des données physiopathologiques permet de comprendre tout l'intérêt que peut représenter aujourd'hui le dosage de certains marqueurs biologiques pour le diagnostic, l'évaluation de la sévérité de la PA, le risque de complication et de mortalité, voire pour l'étiologie. Le marqueur idéal qui serait unique n'existe bien sûr pas (Tableau 1)

Tableau III : Les caractéristiques et l'intérêt clinique des paramètres biologiques :

Paramètres biologiques	Latence avant libération	Caractéristiques	Intérêt clinique
Marqueurs libérés par les cellules acineuses pancréatiques TAP	<12 heures	Premier marqueur libéré avec surtout une valeur prédictive négative = 100%	+++
α2-Macroglobuline	48 heures	Marqueur tardif de sévérité de PA	?
α1-Antitrypsine	48-96 heures	Marqueur très tardif de sévérité	?
Marqueurs de l'activation des PNN et des macrophages		Marqueur précoce de sévérité	
PNN élastase (activité des neutrophiles)	<24 heures	Marqueur de nécrose pancréatique+atteinte pulmonaire	?
Phospholipase A2 (activité phagocytaire)	24 heures		++
Cytokines et autres marqueurs systémiques	24-48 heures	Cytokine libérée avec l'IL6 Sans avantage par rapport à l'IL6	+
IL1	18-48 heures	Marqueur de détection très précoce : dosage de plus en plus répandu	+++
IL6			
IL8	12-24 heures	Marqueur très précoce : mais encore peu accessible en routine	?
CRP	48-72 heures	Marqueur de sévérité le plus accessible	+++
PCT	24-36heures	Marqueur du risque d'infection du pancréas nécrose	++

IV. Anatomie pathologie : [14, 15,16]

On distingue deux grandes formes anatomopathologiques de la pancréatite aigüe: la pancréatite oedémateuse, simple, limitée à la glande, d'évolution habituellement bénigne et la pancréatite aigue necrotico-hémorr0 toujours possible.

1. La pancréatite oedémateuse : [16]

C'est la forme la plus fréquente. Le pancréas est augmenté de volume, en masse. Les lobules et les acini sont dissociés les uns des autres par l'oedème. Les méso et le tissu conjonctif sont infiltrés d'oedème sans aspect nécrotique ou hémorragique.

2. La pancréatite nécrosante : [16]

C'est une forme grave responsable des tableaux cliniques sévères. Le pancréas est augmenté de volume et de consistance dure.

La PAN est caractérisée par une nécrose des tissus glandulaire, interstitiels et à l'espace rétro péritonéal. La nécrose graisseuse prédomine et se manifeste par des taches de bougie. Ces zones de nécrose, plus ou moins étendues, sont associées à des lésions hémorragiques et à des phénomènes de thrombose vasculaire.

Cette forme est, avec des lésions à distance correspondent à la toxémie enzymatique lésions viscérales diverses (poumons, reins, coeur...)

V. Données démographiques et épidémiologiques:

1. Fréquence:

La plupart des études montrent que l'incidence annuelle des PA varie entre 30 et 45 / 100 000 habitants [17–18].

L'incidence observée au Pays-Bas est de 14,7/100 000 habitants [19] et tandis qu'au Japon elle est de 45.1/100 000 habitants [20].

Ces différences d'incidence peuvent être expliquées par des facteurs environnementaux ou des facteurs d'expositions comme l'alcool.

Dans notre série nous avons colligés 270 cas sur une période de 2 ans soit une incidence de 13,5 / 100 000 habitants

2. Age:

Dans notre étude, l'âge moyen était de 48,3ans, 53ans dans la série de SORAN et COLL[21], 59.2ans dans la série BECHIMOL et COLL[22], 62ans dans la série de MAJDOUB A et al[23], 52ans dans la série de TAYAB MUSTAPHA[24], 54.7ans dans la série de AYNAOU[25].

Tableau IV: Comparaison de l'âge dans notre série avec d'autre série

Série	Age moyen
Notre série	48.3ans
SORAN et COLL[21]	53ans
BECHIMOL et COLL[22]	59.2ans
MAJDOUB A et al[23]	62ans
TAYAB MUSTAPHA[24]	52ans
AYNAOU[25]	54.7ans

Bien que l'étiologie de la PA est radicalement différente entre les pays Anglo-Saxon et le Maroc la moyenne d'âge de survenu est pratiquement comparable.

3. Sexe :

La pancréatite aigüe est plus fréquente chez l'homme que chez la femme d'après les résultats de plusieurs séries [21,22,23]. Cette nette prédominance masculine est liée à l'abus d'alcool. Les études épidémiologiques confirment que l'origine biliaire étant deux fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme [26].

Dans notre étude les femmes prédominaient avec un pourcentage de 81% représentaient 10 cas ((19%), les femmes représentaient 44 cas (81%).

Le sexe féminin prédomine aussi dans les séries de TAYAB et AYNAOU avec des taux successifs de 59% et de 63%.

Tableau V: Fréquence selon le sexe.

	Femmes	Hommes
SORAN et COLL[21]	42%	58%
BECHIMOL et COLL[22]	48%	52%
MAJDOUB A et al[23]	44%	56%
TAYAB MUSTAPHA[24]	59%	41%
AYNAOU[25]	63%	37%
Notre série	81%	19%

VI. Diagnostic positif:

1. Clinique:

Le symptôme qui fait suspecter le diagnostic de PA est la douleur. Elle est typiquement de siège sus ombilical en barre, épigastrique ou dans l'hypochondre droit, intense, d'installation rapide puis permanente, rebelle aux antalgiques, parfois calmée par l'antéflexion du tronc, irradiant dans le dos [27,28]

Dans notre étude, le tableau clinique à l'admission est conforme aux tableaux décrits dans la littérature. La douleur abdominale est le signe le plus constant, elle est présente dans 100% des cas ; suivie, par ordre de fréquence, par les vomissements.

La fièvre, la défense abdominale et le météorisme abdominal ont pratiquement la même fréquence. Les autres signes sont moins fréquents et sont résumés dans le tableau VII

Dans notre étude et dans les autres études la douleur abdominale était le symptôme le plus fréquent avec des pourcentages allant de 90% à 100%.

Tableau VI : Comparaison des signes cliniques de notre série avec d'autres séries

Références Signes cliniques	Soran Et Coll. [21]	BECHIMOL et COLL[22]	MAJDOUB A et al[23]	TAYAB MUSTAPHA[24]	Aynaou [25]	Notre série
Douleurs abdominales	100%	90-95%	100%	100%	97.6%	100%
Défense épigastrique	50%	30%	16.9%	26.31%	30%	90.7%
Vomissements	80%	50-80%	76.42%	36.17%	70%	74%
Arrêt des matières et des gaz	25%	-	17.92%	-	-	5.5%
Fièvre	75%	75%	63.2%	40.78%	32.5%	83.3%
Météorisme	65%	30%	21.69%	35.29%	-	5.5%
Ictère ou sub- ictère	30%	25%	22.64%	30.29%	12.5%	14.8%
Masse abdominale	20%	3%	-	-	-	-
Choc	15%	10-15%	1.89%	13.15%	-	-

2. Diagnostic biologique:

2.1 Bilan biologique à visée diagnostique:

Actuellement le diagnostic de la PA est clinico-biologique, et basé sur une lipasémie > 3 fois la normale.

La lipasémie a une sensibilité de 94%, et une spécificité de 96%. [29,30]. L'augmentation de la lipasémie commence à partir de la 4ème jusqu'au 8ème heures avec un pic à 24h, et se normalise après 8 à 14 jours.

Dans notre étude le dosage de la lipasémie était la règle avec une lipasémie ≥ 3 fois la normale dans 95,7% des cas, 94.4% dans l'étude de Soran Et Coll[21], 96.6% dans l'étude de BECHIMOL et COLL[22], 98.3% dans l'étude de MAJDOUB A et al[23], 94.8% dans l'étude de TAYAB MUSTAPHA[24], 92.3% dans l'étude de Aynaou[25]

Tableau VII: Pourcentage de la lipasémie ≥ 3 fois la normale dans les différentes études

Série	Pourcentage de la lipasémie ≥ 3 fois la normale
Soran Et Coll[21]	94.4%
BECHIMOL et COLL[22]	96.6%
MAJDOUB A et al[23]	98.3%
TAYAB MUSTAPHA[24]	94.8%
Aynaou[25]	92.3%
Notre série	95.7%

2.2 Bilan de retentissement :

2.2-1 L'hyperglycémie :

- ❖ La découverte d'une hyperglycémie au cours d'un syndrome douloureux abdominal doit faire évoquer la PA. [31,32]
- ❖ Dans notre série, la glycémie a été réalisée systématiquement chez tous les malades. Une hyperglycémie supérieure à 2g/l a été constatée chez 13 malades soit 4,8% des cas ce qui témoigne d'une nécrose partielle ou totale de la glande.

2.2-2 Fonction rénale [33] :

Ses modifications peuvent témoigner soit d'une insuffisance rénale fonctionnelle, soit d'une insuffisance rénale organique de mauvais pronostic.

Dans notre série, l'ionogramme a été évalué chez tous les malades. Une insuffisance rénale a été constatée chez 2 patients (0,7%).

2.2-3 Numération, plaquettes, hémocrite :

- ❖ La polynucléose est fréquente au cours de la PA, et fait partie du score pronostique.
- ❖ Dans notre série, la NFS a été réalisée chez tous nos malades.
- ❖ Une hyperleucocytose supérieure à 12000 éléments/mm a été observée chez 126 malades soit 46,6% des cas.
- ❖ Une thrombopénie <80 000 élt/mm³ a été retrouvée chez 1,8% de nos malades.

3. Imagerie : [34, 35,16,36]

Lorsque le diagnostic de PA est porté sur des signes cliniques et biologiques, il n'y a pas lieu de réaliser un examen d'imagerie pour le confirmer. En pratique, un bilan radiologique en urgence est nécessaire en cas de doute diagnostique et est obligatoire (de façon plus ou moins

retardée) dans le cadre de la recherche d'une étiologie, pour évaluer la gravité et en cas d'aggravation secondaire à la recherche des complications [34].

3.1 Radiographie standard : [34, 16,37]

L'ASP ne contribue pas au diagnostic de pancréatite aigüe, mais en urgence, il a surtout pour but d'éliminer d'autres diagnostics [37] (une perforation digestive qui s'exprimerait par un pneumopéritoine). Le cliché est normal dans 20 à 25% des cas. Cependant, de nombreux signes de pancréatite aigüe ont été décrits mais ils sont aujourd'hui accessoires [37] : la présence d'une anse grêle "sentinelle", des bulles de gaz dans la région pancréatique ou un abdomen opaque lié à la présence d'ascite.

La radiographie du thorax garde un intérêt dans la recherche d'épanchements pleureux [36]. L'incidence des complications pulmonaire, souvent associées à une défaillance rénale ou cardiaques [38], varie de 15 à 50%. Ces conséquences pulmonaires au cours de la PA sont variables, allant de l'hypoxémie modérée asymptomatique, sans signe clinique ni radiologique au syndrome de détresse respiratoire aigüe. L'hypoxémie se développe dans un tiers des cas et l'œdème pulmonaire, qui résulte de l'augmentation de la perméabilité des micro vaisseaux pulmonaire, se rencontre dans approximativement 10% des patients. Les épanchements pleuraux sont rapportés dans 14 à 20% des cas. La physiopathogénie de ces lésions pulmonaires est complexe et n'est pas bien élucidée [39,40].

Dans notre série, la radiographie thoracique avait objectivé des pleurésies d'importance variable chez 2.5%.

3.2 Echographie [34, 14, 16, 36,37]

L'échographie est l'examen le plus sensible pour évaluer les voies biliaires à la recherche d'une lithiase vésiculaire, éventuellement associée à une dilatation de la voie biliaire principale. Elle permet de faire le diagnostic de PA avec une spécificité de l'ordre de 90%, mais une

sensibilité variable de 60 à 90%. Sa sensibilité dans le diagnostic d'une lithiasse de cholédoque est faible, surtout si les voies biliaires ne sont pas dilatées. Une échographie vésiculaire normale n'exclut pas l'origine biliaire d'une PA et ne permet donc pas d'éliminer totalement une étiologie biliaire, ce qui conduit à la répétition de l'examen à distance de l'épisode initiale.



Figure 22: VBP dilatée au cours d'une PAB.



Figure 23: Kyste hydatique multi cloisonné compliqué de pancréatite aiguë.



Figure 24: Plaque hypoéchogène hétérogène aux dépens de la portion Corporeo-céphalique du pancréas.(Faux kyste du pancréas).

3.3 Tomodensitométrie: [41]

La TDM abdominale avec injection de produit de contraste est l'examen de référence dans le bilan de PA, Elle est indiquée en cas de :

- ❖ Diagnostic clinique de PA incertain ;
- ❖ Confirmation de la gravité de la PA
- ❖ Absence d'amélioration après 72 heures de traitement conservateur;
- ❖ Dégradation du tableau clinique après amélioration initiale.

La TDM doit être réalisée au mieux 72 à 96 heures après le début des signes cliniques. Dans la majorité des cas le scanner n'est pas requis dans le diagnostic de la pancréatite aigue, il n'est pas recommandé de la pratiquer de façon précoce parce qu'il n'y a aucune preuve que la TDM prématurée améliore les résultats cliniques ou que le dépistage précoce de la

nécrose va influencer sur le traitement et le score de Balthazar n'est pas supérieur aux autres scores cliniques pour prévoir la sévérité de la PA [42]

Le scanner pancréatique peut être normal pour des pancréatites aigues de faible importance. En absence de complications, on observe habituellement une glande augmentée de volume, se rehaussant nettement après injection, associée à un aspect infiltré de la graisse péri pancréatique. La TDM permet de classer les lésions pancréatiques en cinq stades de gravité croissantes. Le tableau suivant donne la classification scannographique de Balthazar.

Tableau VIII: La classification scannographique :

Le score de balthazar
Stade A : pancréas normal
Stade B : élargissement focale ou diffus du pancréas
Stade C : Pancréas hétérogène avec densification de la graisse péri pancréatique
Stade D : Coulée péri pancréatique unique
Stade E : Coulées de nécrose multiples ou présence de bulles gazeuses au sein d'une coulée

Dans notre étude la TDM a été réalisé chez 100% des patients avec un délai moyen de 45 heures après l'admission, ce délai est largement supérieur à 72 heures puisque les patients sont admis en moyenne 4,5 jours après le début de la maladie. Cet examen était indiqué initialement afin d'évaluer la gravité puis au cours de l'évolution en cas de suspicion de complications.

Tableau IX :le pourcentage des différents stades de la pancréatite

	Notre série	Soran Et Coll[21]	BECHIMOL et COLL[22]	MAJDOUB A et al[23]	TAYAB MUSTAPHA[24]	Aynaou[25]
Stade A	4%	10%	8%	13%	8%	6%
Stade B	30%	22%	27%	36%	20%	29%
Stade C	48%	36%	42%	39%	51%	49%
Stade D	17%	19%	16%	7%	13%	10%
Stade E	7%	13%	7%	5%	8%	6%

3.4 IRM:

L'IRM peut être proposée à la place de la TDM particulièrement chez les patientes enceinte ou présentant une altération de la fonction rénale elle permet un diagnostic morphologique proche à la TDM, elle précise mieux la nature des coulées de nécrose.

Elle est plus performante en terme de diagnostique étiologique notamment d'une origine néoplasique ou biliaire avec une sensibilité de 94% et une spécificité de 97%. [41]

Dans notre série, 5 patientes ont bénéficiées d'une IRM dont 2 étaient enceintes de 12 SA et 16 SA qui a révélé et 3 avait une dilatation de la VBP sans obstacle décelable à l'échographie et la TDM :

- ❖ Micro-lithiase du bas cholédoque chez 1 patient
- ❖ Ampullome vaterien
- ❖ Légèrement dilaté sans obstacle chez 2 patientes
- ❖ Normale chez un patient

3.5 Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique:

L'emploi de la CPRE à visée purement diagnostique a considérablement diminué en raison des performances obtenues par les autres méthodes diagnostiques : écho-graphie, la TDM, IRM, échoendoscopie. Elle garde un intérêt spécifique pour le diagnostic des lésions canalaire débutantes (cholangite sclérosante, pancréatite chronique), des variations anatomiques (pancréas divisum, anomalies de la jonction biliopancréatique), de la pathologie tumorale ampullaire et pour la réalisation de certains prélèvements (biopsies ampullaires, recherche de microcristaux, cytologie endocanalaire...). Il reste un examen de recours en cas de problème diagnostique non résolu par les autres méthodes

VII. Diagnostic de gravité :

Le diagnostic de gravité est une étape fondamentale dans la prise en charge de la PA. A la phase initiale le diagnostic de gravité est fondé sur 3 paramètres :

- ❖ Le terrain (âge, comorbidités, indice de masse corporelle). [43]
- ❖ Score bioclinique.
- ❖ Évolution après les premières mesures thérapeutiques comme la réhydratation (persistance du SIRS, urée sanguine, créatinine). [44]

1. Score bioclinique:

1.1 Score du syndrome de réponse inflammatoire systémique:

Le SIRS est défini par l'association de deux ou plus des conditions suivantes :

- ❖ Température < 36°C ou > 38°C ;
- ❖ Fréquence cardiaque > 90/min ;
- ❖ Fréquence respiratoire > 20/min ou PaCO₂ < 32 mmHg ;
- ❖ Leucocytose >12 000/mm³, < 4 000/mm³ ou présence de formes immatures circulantes (> 10% des cellules). [45]

Il est actuellement le score de référence dans l'établissement de la gravité des PA à l'admission et 48 heures [41]. Un SIRS persistant plus de 48 heures est associé à une mortalité de 25% versus 8% pour un SIRS transitoire [46]. La sensibilité et la spécificité d'un SIRS persistant pour la prédiction de la mortalité sont respectivement de 77-89% et 79-86% [46-48]. Un SIRS présent à l'admission a une sensibilité de 100% mais une spécificité de 31% [47].

Ce score présente l'avantage d'être simple, facile à mémoriser avec la possibilité de le répéter [46,48]. Eu égard à ces avantages le SIRS est devenu le gold standard pour prédire la sévérité de la PA [41]

1.2 Score de Ranson :

Le score de Ranson est le plus ancien, c'est le score de référence dans l'établissement de la gravité des PA [49] (tableau IX). Cependant, il présente quelques limites :

- ❖ L'évaluation de la gravité à 48 heures est tardive ;
- ❖ Certains paramètres sont difficiles à obtenir en urgence ;
- ❖ Il existe une interférence avec les traitements symptomatiques administrés ;
- ❖ Les patients opérés en urgence sont exclus.

Tableau X: Score de Ranson [49]

	Age	>55 ans
A l'admission	Leucocytes	>16000 /mm ³
	Glycémie	>11 mmol/L
	LDH	>350 U/L (1.5 N)
	ASAT	>250 U/L (6N)
Durant les premières 48 heures	Hématocrite	Diminué de plus de 10%
	Urée sanguin	Augmenté de plus de 1.8 mmol/L
	Calcémie	< 2mmol/L
	PaO ₂	< 60 mm Hg
	Déficit en bases	> 4mmol/L
	Séquestration liquidienne	> 6 L

Le score d'Imrie est dérivé du score de Ranson (tableau X). Les études n'ont pas démontré sa supériorité par rapport au score de Ranson (une sensibilité de 61% versus 76% et une spécificité de 85% versus 70%). Cependant il offre une nette facilité d'utilisation en pratique.

Tableau XI: Score d'Imrie [50]

Age	> 55 ans
Leucocytes	> 15 000/mm ³
Glycémie	> 10 mmol/L
LDH	> 600 U/L (3,5N)
Urée sanguin	> 16 mmol/L
Calcémie	< 2 mmol/L
PaO ₂	< 60 mm Hg
Albuminémie	< 32 g/L
ASAT	> 100 U/L (2N)

1.3 Score APACHE II :

Le score APACHE II est un score de gravité non spécifique de la PA [51]. La plupart des auteurs reconnaissent son intérêt majeur. Il a l'avantage d'être apprécié à l'admission et permet une évaluation quotidienne de la gravité.

Il existe d'autres scores de gravité pour la PA (score de Glasgow) et de marqueurs biologiques indépendants (CRP, hématokrite, pro calcitonine, Urée) Mais aucun de ceux-ci n'est clairement supérieur Ou inférieur au score de SIRS [52]

Dans notre série nous avons opté pour le score de SIRS ce qui a permis une bonne évaluation de la gravité des PA dans notre service.

Le score était présent à l'admission chez 9 patients soit 3.3% des cas et il était persistant chez 3 patients (1.1%).

2. Index de sévérité TDM :

L'index de sévérité TDM de Balthazar possède une réelle pertinence pour apprécier la gravité des PAN et prédire la mortalité [53,54] (tableau VIII). Il permet de diagnostiquer la sévérité avec une sensibilité de 85,7% et une spécificité de 71% et de prédire la mortalité avec une sensibilité de 100% et une spécificité de 58,5% [55].

VIII. DIAGNOSTIC DE L'ORIGINE BILIAIRE DE LA PANCREATITE AIGUË :

Le diagnostic de l'origine biliaire d'une PA repose sur des arguments cliniques, biologiques et morphologiques. Des scores clinico-biologiques ont été développés depuis l'étude de Blamey et al [56], mais les travaux récents sont essentiellement portés sur l'acquisition diagnostique par l'imagerie, en particulier avec le développement récent de l'échoendoscopie et de la cholango-IRM.

1. Arguments cliniques:

L'origine biliaire d'une pancréatite aiguë peut être évoquée devant :

- ❖ Des données de l'anamnèse (antécédents de poussées de pancréatite aigue, la notion de lithiase biliaire connue)
- ❖ Une symptomatologie fonctionnelle évocatrice (douleurs abdominales, nausées/vomissements, ictère)
- ❖ Données de l'examen physique (distension abdominale, défense épigastrique, douleur de l'hypochondre droit, signe de Murphy positif).

Le diagnostic clinique de certitude de l'origine biliaire de la PA n'est pas toujours évident, est repose sur un faisceau d'arguments.

a) Les antécédents:

➤ *Les antécédents biliopancréatiques :*

L'existence d'antécédents évoquant des douleurs biliaires est en faveur de l'origine biliaire d'une PA, dans notre série les antécédents bilio-pancréatiques retrouvés dans 15 cas soit 22,5%.

➤ *Les tares associées :*

Tableau XII: tableau comparatif des tares associées

	MAJDOUB A et al [23]	AYNAOU [25]	Notre série
Diabète	9%	18.4%	14.8%
HTA	8%	13.5%	16.6%
Dyslipidémie	–	32%	–
Obésité	22%	9%	16%
Alcoolisme	–	4%	9.2%

🚩 **Signes cliniques :**

Le diagnostic clinique de PA repose essentiellement sur les douleurs abdominales qui sont retrouvées de manière quasi constante.

Une autre étude randomisée publiée par Paloyan et coll [57], 148 patients présentant une PA dont 82 d'origine biliaire ont été inclut, l'ictère a été observé chez 27 % des malades ayant une PA biliaire et chez 13 % des malades ayant une PA alcoolique. Ainsi, l'association ictère, sensibilité de l'hypochondre droit et signe de Murphy positif serait un syndrome clinique discriminant pour l'origine biliaire d'une PA [58,59]. Dans notre série l'orientation vers l'origine biliaire des pancréatites aiguës suspectée à la phase clinique chez 33 malades soit 50%, elle était basée sur les arguments suivants :

- ❖ les A.T.C.D bilio-pancrétiques retrouvés dans 15 cas soit 22,5%.
- ❖ Un ictère rétentionnel retrouvé dans 9 cas, soit 13 %.
- ❖ Un tableau d'angiocholite retrouvé dans 9 cas, soit 13,6%.

2. diagnostic biologique :

a) Les enzymes pancréatiques :

L'amylase n'est pas sécrétée uniquement par le pancréas mais aussi par les glandes salivaires. Au cours d'une PA, l'amylase sérique s'élève précocement atteignant son maximum quelques heures après le début des symptômes. Sa demi-vie est de 12 heures et donc la normalisation de l'amylasémie survient dans les 24 heures [60],

La lipase sérique est produite et sécrétée exclusivement par le pancréas. Son élévation est un peu retardée par rapport à l'amylasémie au cours d'une PA et se normalise plus de 48 heures après le début de la PA. Le dosage de la lipasémie a une sensibilité de 94% et une spécificité de 96%, supérieur à celles de l'amylasémie [60].

Le diagnostic positif est porté sur élévation de la lipasémie $>3N$ définition prise en compte par la conférence de consensus de 2001[61].

b) La cytolyse :

Blamey et Dougherty [56,62] ont étudiés lors de 2 études publiées respectivement en 1983 et 1988, la place des aminotransférases dans l'orientation précoce vers l'origine biliaire des PA, leurs conclusions peuvent être résumées comme suit :

- ❖ L'activité sérique de l'ALAT et de l'ASAT était plus élevée à l'admission en cas de PA biliaire qu'en cas de PA non biliaire.
- ❖ L'élévation de l'ALAT ou de l'ASAT au delà de $10X N$ avait une valeur prédictive de l'origine biliaire d'une PA [63].
- ❖ Notant que Blamey [56] a souligné une augmentation plus précoce et rapidement régressive des (ALAT).

Dans notre série les transaminases ont été dosées chez 50 malades et ont été élevées chez 25 malades soit 50%.

c) la choléstase :

Lors de son étude intitulée « Biochemical prediction of gallstones early in an attack of acute pancreatitis » publiée en 1979, McMahon [64] a comparé les taux sanguins des GGT, des PAL et de la Bilirubine chez les patients présentant une PAB et ceux présentant une PA non biliaire les résultats ont été comme suit : • Le taux de Gammaglutamyltranspeptidase (GGT) : Le taux de GGT à l'admission était plus élevé en cas de PA biliaire qu'en cas de PA non biliaire, et il est encore plus élevé en cas de calculs dans la Voie biliaire principale [64]. • Le taux de Phosphatases alcalines (PAL) : Le taux de PAL à l'admission était plus élevé en cas de PA biliaire qu'en cas de PA non biliaire. Ce taux était de 66 à 86 % en cas de PA biliaire contre 10 à 36 % en cas de PA non biliaire. La spécificité du diagnostic de PA biliaire devenait très élevée au delà de 2,5 ou 3 N. Le taux des PAL était significativement plus élevé dans le groupe des PA biliaires en cas de calculs dans la voie biliaire principale [64] • Le taux de bilirubine La bilirubinémie à l'admission était plus élevée en cas de PA biliaire qu'en cas de PA non biliaire .Elle était > 25 mmol/L dans 62 % des cas de PA biliaire [64]. Dans notre série, le bilan hépatique a objectivé un syndrome de choléstase dans 56 % avec un taux GGT élevé chez 39 malades soit 59% ; un taux de PAL élevé chez 39 malades soit 59% et un taux de bilirubine élevée chez 33 malades soit 50%.

d) La dosage de la C- réactive protéine (CRP) :

Le dosage de la CRP, facile à obtenir aujourd'hui en routine, n'a pas de valeur diagnostique mais mérite d'être réalisé précocement puis renouvelé comme marqueur potentiel de nécrose [65,66]. Dans notre séries ; elle a été pratiqué chez 56 malades soit 85% ; elle a été élevée dans 23 cas soit 41%.

3. Diagnostic radiologique:

a) Apport de l'échographie abdominale :

L'échographie abdominale a pour principaux avantages sa facilité, son coût modeste, et sa disponibilité. Cependant, l'examen est très opérateur dépendant et ne permet d'explorer le pancréas que dans 55 à 60% des cas, en raison d'un iléus réflexe très fréquent. Les premières études évaluant l'échographie pour le diagnostic de lithiase vésiculaire au cours de la PA biliaire faisaient état de performances excellentes [67], La sensibilité et la spécificité de l'échographie effectuée durant les 72 premières heures d'hospitalisation étaient de 69 % et 80 % pour le diagnostic de lithiase vésiculaire dans une série prospective de 88 cas de PA dont 39 sont d'origine biliaire. Par contre sa sensibilité dans le diagnostic d'une lithiase du cholédoque était faible ne dépassant pas 45 % [68]. Devant les limites de l'échographie dans la visualisation directe de la voie biliaire principale, on recherche habituellement les signes indirects en faveur de l'origine biliaire de la PA, notamment : la dilatation des voies biliaires et la présence d'un sludge vésiculaire [58,68,69]. Une échographie vésiculaire normale n'exclut pas l'origine biliaire de la PA. Dans la série de Lee et al. 23 de 31 malades qui avaient une PA réputée idiopathique, avaient une microlithiase biliaire à l'examen de la bile duodénale [70]. La moitié d'entre eux (48 %) seulement, avaient un sludge vésiculaire. Au cours du suivi des malades, la répétition de l'échographie vésiculaire peut mettre en évidence une lithiase vésiculaire, indétectable initialement [71]. Dans notre série l'échographie faite à l'admission chez 54 malades a permis de mettre en évidence une dilatation de la voie biliaire principale dans 17 % des cas et de retrouver une lithiase vésiculaire dans 63 % soit une sensibilité de 65%.

L'origine biliaire de la pancréatite a été retrouvée par la répétition des échographies après la phase aigue de la pancréatite.

b) Apport de la TDM abdominale :

La TDM est aujourd'hui l'examen de référence pour l'évaluation pronostique des malades atteints de PA [72] .Elle permet de faire la différence entre les PA sévères et bénignes grâce à la classification de BALTHAZAR. Selon une revue de la littérature de Malka D et Rosa-Hézode I de

2001 [60], le tableau suivant résume la sensibilité, la spécificité et l'efficacité diagnostic de la TDM abdominale dans la PAB :

Tableau XIII : La TDM abdominale dans la PA biliaire

	Lithias de la voie	Lithias vésiculaire
Sensibilité	50 %	55 %
Spécificité	100 %	100 %
Efficacité diagnostic	Nr*	91 %

Dans notre série la TDM a permis de mettre en évidence la lithiase biliaire chez 38 patients, soit 70.4%.

c) Apport de la cholangio-IRM :

Le développement récent de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire a permis d'obtenir une bonne visualisation des canaux biliaires et pancréatiques. Les premières études ont d'emblée souligné la grande valeur diagnostique de la 44 cholangio-IRM [73,74, 75,76]. La sensibilité et la spécificité dépassent 90 % avec un seuil de détection de 3 mm. La supériorité par rapport à la cholangiographie intraveineuse a été établie [75] avec une précision diagnostique de 94 %. Deux études prospectives publiées en 1996 ont confirmé ces bons résultats [77,78]. La cholangio-IRM est donc une méthode prometteuse pour la recherche de lithiase cholédocienne lors des pancréatites aiguës biliaires (PAB), mais ses performances doivent encore être validées, en particulier pour la détection de petits calculs [79]. Elle présente l'avantage d'être une méthode non invasive, mais la faible disponibilité des appareils dans certains centres limite ses indications, en particulier en matière d'urgences digestives. Nous avons eu recours à la cholangio-IRM dans notre série une seule fois, permettant d'orienter le diagnostic étiologique des PA en objectivant des micro-lithiases cholédociennes

d) Apport de l'échoendoscopie (EE) :

L'échoendoscopie biliaire s'est développée essentiellement au cours des 20 dernières années et s'est progressivement imposée comme une technique de référence d'imagerie de la lithiase biliaire [79], que celle-ci soit cholédocienne et/ou vésiculaire.

Deux études ont évalué la place de l'échoendoscopie dans la prise en charge précoce de la pancréatite supposée biliaire [80,81]. Dans le travail de Sugiyama et al. 24 malades avaient une pancréatite d'origine biliaire, sévère dans 6 cas (selon le score APACHE II) [81]. La sensibilité de l'échoendoscopie et sa précision 45 diagnostique, tant pour le diagnostic de lithiase cholédocienne que vésiculaire étaient de 100 %, la faisabilité étant totale. Le tableau suivant résume l'apport des différentes techniques d'imagerie dans le diagnostic des lithiases biliaires au cours des PAB.

Tableau XIV : Apport des différentes techniques d'imagerie dans le diagnostic des lithiases biliaires [82]

		ECHOGRAPHIE	T.D.M	ECOENDOSCOPIE	CHOLANGIO-IRM
Sensibilité %	LVBP	45	53	96	94
	LV	- 68	65	—	—
Spécificité %	LVBP	—	57	99	97
	LV	80	69	—	—

e) apport de la choloangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) :

C'est l'exploration la plus ancienne dans le diagnostic de la lithiasse de voie biliaire principale. C'est aussi la plus invasive car elle fait courir le risque de pancréatite aiguë et de perforation duodénale. Le cathétérisme a été remplacé dans sa fonction diagnostique par l'échoendoscopie. Il est cependant toujours indispensable comme premier temps d'un geste de sphinctérotomie endoscopique [82].

IX. DIAGNOSTIC DE GRAVITE :

L'identification urgente de la gravité des PAB demeure un objectif primordial vu ses implications thérapeutiques, notamment la désobstruction biliaire urgente. Plusieurs scores clinico-biologiques et morphologiques ont été développés afin de subvenir à cet objectif.

1. score de Ranson

Il est admis dans la littérature que 10 à 20% des PA sont des PA sévères. Un score de Ranson >3 correspond de manière consensuelle dans la littérature à une PA sévère.

2. Scores de Balthazar:

L'index de sévérité tomодensitométrique, décrit par Balthazar et Freeny [83], présente une bonne corrélation avec la morbidité et la mortalité. Il quantifie l'inflammation pancréatique et péri-pancréatique en cinq grades :

☐ Grade A : pancréas normal.
☐ Grade B : hypertrophie diffuse ou localisée du pancréas et ou irrégularités des contours.
☐ Grade C : obscurcissement de la graisse péri-pancréatique, hypertrophie et hétérogénéité du pancréas.
☐ Grade D : Phlegmon ou collection péri-pancréatique unique.
☐ Grade E : Phlegmon ou collections multiples et/ou présence de gaz intra ou péripancréatique.

Les malades qui ont un grade A ou B ont souvent une évolution plus favorable (0 % d'abcès) que ceux de grade C (12 % d'abcès), de grade D (17 % d'abcès, 8 % de mortalité) et de grade E (61 % d'abcès, 17 % de mortalité) [83].

La combinaison du score bioclinique de Ranson et du grade tomodensitométrique, de Balthazar et Freeny, permet de mieux estimer la gravité de la maladie [83]. Le risque d'abcès est nul chez les malades de grade A, B ou C avec un indice de Ranson inférieur à 2. À l'opposé, l'incidence des abcès atteint 80 % chez les malades de grade E avec un indice de Ranson supérieur ou égal à 6 [84].

3. Défaillance multi viscérale :

Le passage en réanimation et la défaillance multiviscérale sont résumés ainsi dans le tableau suivant :

Tableau XV : passage en réanimation et défaillance multi viscérale

	SORAN et Coll [21]	BECHIMOL et Coll [22]	MAJDOUB A et al [23]	TAYAB MUSTAPHA [24]	AYNAOU [25]	Notre série
Passage en Réanimation	30%	15.5%	15%	33.5%	4.5%	1.9%
Défaillance multi viscérale	–	12.12%	15%	–	5%	3.70%
Mortalité	3.7%	11%	7%	10.8%	4.5%	3.70%

4. les autres scores de gravité : nous citons

- ❖ Score d'Imrie.
- ❖ Score de Balmey.
- ❖ Score d'Apache.

Ils n'ont pas été évalués dans notre étude.

X. Traitement :

Tout malade porteur d'une PA doit être hospitalisé, Compte tenu de l'évolution possible vers une forme compliquée.

Il est avant tout symptomatique et vise à :

- mettre au repos le pancréas, pallier l'insuffisance pancréatique, corriger les désordres métaboliques et hydroélectrolytiques ; assurer l'analgésie; prévenir et traiter les défaillances d'organes (défaillance respiratoire, hémodynamique, choc, CIVD, insuffisance rénale...) ; diagnostiquer et traiter les complications (infection de nécrose +++) [10,85].

À l'heure actuelle, il persiste des controverses sur plusieurs points :

- L'antibioprophylaxie et la décontamination digestive sélective (DDS)
- la place et les indications de la chirurgie de la nécrose stérile
- les indications de la chirurgie biliaire et de la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE).
- l'intérêt des traitements médicamenteux spécifiques
- l'intérêt et les risques de l'alimentation entérale (AE) précoce [86].

1. TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE :

1.1 La prise en charge de la douleur L'analgésie en matière de pancréatite est un problème difficile.

La réfrigération externe de l'abdomen par vessie de glace est un moyen simple et efficace. La lidocaine injectable peut être utilisé pour son effet antalgique modéré et pour son effet anti-inflammatoire. Le paracétamol est également largement prescrit, mais attention à la toxicité hépatique chez des patients avec atteinte hépatique probable.les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont déconseillés dans ce terrain à haut risque hémorragique.les morphiniques sont souvent nécessaires malgré les risques de dépression respiratoire, d'iléus digestif et

d'augmentation du tonus du sphincter d'oddi. il est cependant évident que l'utilisation d'une analgésie contrôlée par le patient (PCA) est indiquée chez les patients hyperalgiques. [10]

L'utilisation de l'analgésie péridurale a été préconisée du fait qu'elle procure une meilleure analgésie et diminue l'iléus par l'amélioration de la vascularisation splanchnique ; cette analgésie comporte néanmoins des risques en cas de survenue de troubles de la coagulation.

Dans notre étude, le traitement antalgique est dominé par les paliers 1 et 2 :

Paracétamol injectable (PAERFALGAN) dans 72,4% des cas, néfopam (ACUPAN) dans 23,6% des cas ; les dérivés morphiniques dans 2,8% et les antispasmodiques ont été prescrits chez 13 malades (6,3%).

1.2 La prise en charge hémodynamique et la correction des troubles hydroélectrolytiques :

La compensation des pertes hydro électrolytiques et le rétablissement d'une volémie correcte doivent être effectués de façon précoce.

L'apport de cristalloïdes est généralement nécessaire pour corriger les pertes en eau et en NaCl, guidé par la surveillance hémodynamique, de la diurèse, (sondage urinaire en fonction de la sévérité du tableau) de l'hématocrite et de la protidémie.

Les macromolécules ne sont nécessaires qu'en cas d'état de choc. Chez un adulte sans antécédents, un volume de 35 ml/kg/j de cristalloïdes sert de base pour la réhydratation et sera adapté en fonction des bilans entrée_ sortie, des ionogrammes sanguins et des numérations effectuées de manière au moins quotidienne. Les apports en potassium magnésium et calcium doivent être effectués en fonction des déficits rencontrés. Une hyperglycémie > 13,9mmol/l nécessite un apport en insuline. Les transfusions sanguines ne sont indiquées qu'en cas d'hématocrite <25%. Une surveillance régulière des gaz du sang à la recherche d'une acidose est recommandée comme premier signe d'une hypovolémie sévère ou de nécrose [87,88].

Dans notre série, tous nos patients ont bénéficié d'une réhydratation par les cristalloïdes avec une surveillance hémodynamique, de la diurèse et du bilan

entrée-sortie.

L'hyperglycémie fut corrigée selon le schéma de l'insuline en fonction de la glycémie capillaire.

1.3 maintien de l'hémostase :

L'hypoxémie en cas de pancréatite aigüe grave est multifactoriel et un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) ou une atteinte pulmonaire modérée (Acute Lung injury=ALI) peuvent apparaître d'emblée ou secondairement dans l'évolution de la pathologie. Ces deux complications pulmonaires de la PA sont secondaires à l'iléus intestinal, à la distension abdominale (gênant ainsi la cinétique diaphragmatique), aux épanchements pleuraux uni ou bilatéraux et à l'atteinte du parenchyme pulmonaire (par les phénomènes inflammatoires systémiques de la PA).

De plus la pancréatite aigüe représente un facteur de risque d'infection (en dehors des infections nosocomiales) avec fréquence des infections pulmonaires aggravant ainsi l'atteinte respiratoire avec altération des échanges gazeux [89]. Les taux plus importants d'infections chez les patients atteints de pancréatite aigüe "sévère en dehors des infections de nécrose peuvent s'expliquer par les mécanismes de translocation bactérienne en provenance du tube digestif, souvent cités dans la physiopathologie de la pancréatite aigüe", ou par la gravité des défaillances multiviscérales rencontrées et par l'exposition aux dispositifs invasifs de réanimation. Et le poumon est le premier organe rencontré par les germes suite à la translocation bactérienne ; ce qui expliquerait sans doute la fréquence des infections pulmonaires en cas de PA et les dispositifs invasifs de la réanimation (intubation ventilation) constituent un facteur qui potentialise l'incidence de ces infections [90].

La défaillance respiratoire est fréquente au cours de la PA (60% des PA) [90] et la prise en charge respiratoire doit être débutée précocement par, d'abord la position demi-assise, l'oxygénothérapie aux lunettes ou masque à oxygène permettant d'améliorer la PaO₂

L'oxygénothérapie nasale a concerné 21 patients, soit 8,4 % de l'ensemble de nos malades, la ventilation non invasive (VNI) a été essayée chez 2 patients avant la ventilation mécanique. Cette dernière a été instaurée chez 8 patients ayant présenté une infection de nécrose à un moment de leur évolution.

1.4 La prise en charge nutritionnelle :

Quel que soit le mode de nutrition, celle-ci doit être mise en place le plus rapidement possible et dans un délai minimum de 7 jours. En effet, il existe un état d'hypercatabolisme qui justifie un apport nutritionnel suffisant, car le risque de voir apparaître la dénutrition est important. Les modalités d'apport vont être fonction de l'état du patient et notamment de l'existence ou non d'un iléus réflexe.

L'apport nutritionnel se fait grâce à une sonde naso-jéjunale ou via une jejuéostomie qui sera mise en place en cas d'actes opératoires. Mais, la jéjunostomie seule ne doit pas constituer une indication chirurgicale. Le meilleur moment pour commencer la nutrition entérale est cependant inconnue :

Dans leur revue, Marik PE, Zaloga GP ont constaté qu'à partir de la nutrition entérale réalisée tôt dans les premières 24 heures, une faible incidence des infections est notée par rapport à une nutrition entérale débutée 36 heures plus tard (RR, 0.45; 95% CI, 0.30-0.66; = 0.00006) [91,92]

Un essai randomisé a été à l'échelle nationale récemment commencé aux

Pays-Bas afin de déterminer si un début très précoce de la nutrition entérale (dans les 24 heures après l'admission) réduit les complications infectieuses et la mortalité par rapport à la nutrition entérale démarrée après 72 heures [86]

La nutrition entérale comparée à la nutrition parentérale a considérablement réduit la mortalité ; ceci a été démontré dans une méta-analyse récente de Petrov MS et collègues qui ont conclu que la nutrition entérale comparée à la nutrition parentérale a considérablement réduit la mortalité, les complications infectieuses

et l'infection pancréatique chez les patients chez qui on prédit une pancréatite aigue grave.[86,87].

Dans notre série, 6 patients ont bénéficié d'une alimentation entérale par la jéjunostomie et le reste a bénéficié d'une alimentation entérale et parentérale.




Figure 25: algorithme du support nutritionnel de la pancréatite aigue [99]

1.5 L'antibiothérapie :

Compte tenue de la fréquence de survenue de la nécrose (40 à 50%), de la gravité liée à son infection responsable de 80% des décès, une antibiothérapie de prévention a été préconisée par certains. Les germes de surinfection les plus souvent rencontrés (Ecoli, Klebsiella, enterobacter, anaérobies...) font évoquer une origine digestive par translocation bactérienne. Une étude récente semble montrer une contamination par des germes différents en fonction de l'étiologie de la pancréatite, les germes à Gram négatif étant plus fréquemment rencontrés dans les pancréatites biliaires que dans les pancréatites alcooliques [96].

Le rôle des antibiotiques à titre prophylactique chez les patients atteints de pancréatite nécrosante a été largement étudié depuis des décennies [44]. En 1993,

Pederzoli administre, à des patients porteurs de PA nécrotiques, de la tiénamycine durant les deux premières semaines d'évolution. La randomisation avec un groupe placebo a montré une diminution significative des infections pancréatiques et extrapancréatiques. Mais, l'auteur n'a pas pu démontrer de différence en termes de survie [8-50]. Malgré des arguments faibles, beaucoup de sociétés savantes avaient préconisé une administration systématique d'antibiotiques dans les pancréatites graves, mais avec comme conséquence une forte sélection de germes multirésistants et des surinfections par les candidas. La Conférence de Consensus française de 2001 avait tiré la sonnette d'alarme. Elle a limité l'antibiothérapie aux cas d'angiocholites associées. L'intérêt d'une antibiothérapie, instaurée d'emblée, pour prévenir la contamination de la nécrose pancréatique et de l'infection secondaire qui en découle, est donc, au vue des données actuelles de la littérature est sans intérêt voire dangereux [44,51].

Ces dernières années l'antibioprofylaxie a été abandonnée. L'antibiothérapie en cas de pancréatite ne doit être instauré qu'en cas d'infection confirmée et documentée (angiocholite, choc septique, infections nosocomiales) et dans ce cas les dernières conférences de consensus

préconisent des antibiotiques à large spectre qui ont une bonne diffusion dans le parenchyme pancréatique (imipénèmes, meropénème, fluorquinolones, imidazoles) [44, 50,51].

Dans notre série, l'antibiothérapie a été prescrite dans 73 cas (29,2%).

En effet : 60 malades (24 %) ont reçu une amoxicilline protégée. Chez l'ensemble de ces 60 patients, l'antibiothérapie a été prescrite pour une cholécystite ou une angiocholite associée à la pancréatite.

Tous les patients avec surinfection de nécrose ont reçu une antibiothérapie en complément à la chirurgie. Les différents antibiotiques utilisées sont : les imipénèmes, les quinolones, le métronidazole, les aminosides. La durée moyenne de l'antibiothérapie était de 11 jours.

Tableau XVI : Essais randomisés évaluant l'antibioprophylaxie au cours des pancréatites aigues [98]

Etudes	Protocoles D'atbxie	pts inclus vs pts témoins	Critères d'inclusion	Résultats
Finch et al	ampicilline	–	PA	Ni diminution de l'infection ni de la mortalité
Pederzoli et al [1993]	Imipénème pendant 14 jours	41 vs 33	PAN biliaire	Diminution de l'infection mais pas de dim de la DMV, du recours à la chgie et de la mortalité
Sanio et al	Cefuroxime	30 vs 30	PA alcoolique	Taux d'INP identitique Mortalité moindre chez les sujets traités –
Schwarz et al	Ofloxacin et métronidazole	13 vs 13	PAN	Différence en termes d'infection mais Apache II plus faible chez sujets ttt –
	Ceftazidine, métronidazole et amikacine pendant 10 jours	11 vs 12	PAN alcoolique	–
Bassi et al	Imipénème vs perfloxacin pendant 14 jours	30 vs 30	PAN (>50%) et CRP >100mg/l	Dim du taux d'infection chez les groupes tt –

1.6 L'anticoagulation :

L'anticoagulation au cours de la PA est à but préventive (du fait d'une hospitalisation prolongée, de la diminution du retour veineux secondaire au syndrome compartimental, des oedèmes) par l'héparine de bas poids moléculaire (HBPM) ou héparine calcique [8].

Dans notre série 153 patients (soit 61,2%) ont bénéficié d'un traitement préventif de la maladie thromboembolique. Les principaux moyens utilisés sont l'héparine de bas poids moléculaire (Enoxaparine), l'héparine calcique et les bas de contention.

1.7 Anti sécrétoires :

Les antisécrétoires gastriques à type des anti H2 ou plus actuellement les Inhibiteurs de la pompe à proton (I.P.P) ont deux intérêts théoriques : la prévention des ulcères et hémorragies de stress, et la diminution de la sécrétion pancréatique secondaire à l'inhibition de la sécrétion gastrique [100].

Mais actuellement, seul le jeûne et l'aspiration nasogastrique peuvent être retenus.ils sont indispensables à la phase aigue pour lutter contre l'iléus et la stimulation duodénale, liée au passage du suc gastrique.

La sonde gastrique permet de lutter contre les nausées et les vomissements Les parasympholytiques, les antiacides, les antiH2, le glucagon, la calcitonine sont inefficaces et peuvent mêmes avoir des effets délétères.il en est de mêmes des inhibiteurs de synthèse des enzymes pancréatiques et métaboliques.

La somatostatine et son dérivé d'action prolongée, l'octréotide continuent d'être l'objet de multiples études tant expérimentales que cliniques. C'est un puissant inhibiteur de la sécrétion pancréatique, stimulant du système réticuloendothélial et régulateur de la réponse

immune. Elle bloque aussi la sécrétion des TNF et augmente l'activité phagocytaire des monocytes. Mais son effet vasoconstricteur du système splachnique est délétère [53].

Tableau XVII : le traitement médical selon la littérature

	Antalgique	Réhydratation	Nutrition+sonde naso-gastrique	Insulino- thérapie	Antibiothé- rapie	Anticoagu- lants
SORAN et Coll [21]	100%	100%	18%	30.3%	10.7%	37.2%
BECHIM OL et Coll [22]	100%	100%	23%	40%	29.3%	19.2%
MAJDO UB A et al [23]	100%	100%	11.1%	19.5%	30%	21.9%
TAYAB MUSTA PHA [24]	100%	100%	32.6%	23.7%	28.1%	14.2%
AYNAO U [25]	100%	100%	16.7%	20.1%	13.2%	36.3%
Notre série	100%	100%	9.2%	33.3%	18.5%	22.2%

Le traitement contre la douleur a été administré chez tous les patients et a été accompagnés d'une réhydratation. Tous les malades ont reçu une antibiothérapie avec un taux allant de 10.7% à 30%.

2. Traitement curatif :

2.1 APPROCHE THERAPEUTIQUE De la PAB :

Le programme thérapeutique des PAB doit suivre l'évolution de la maladie. La première approche thérapeutique, généralement basée sur un traitement médical, peut se chevaucher pour toute étiologie de la pancréatite. [100]

Les différentes approches thérapeutiques sont conditionnées par les caractéristiques cliniques de la crise pancréatique.

La pancréatite aiguë peut se développer avec un large éventail d'autres maladies, allant d'une forme légère à une forme grave ou précocement grave, et rapidement progressive.

La pancréatite aiguë bénigne est habituellement une forme auto-limitante ne développant qu'un œdème pancréatique et / ou péripancréatique sans modification du parenchyme sur le scanner avec injection du produit de contraste.

Le traitement médical est généralement conservateur et inclut comme mesure principale la réhydratation intraveineuse. Les objectifs du traitement de la PBA légère ou modérée sont les suivants: [102]

Contrôler la douleur, conserver l'équilibre hydro électrolytique, assurer une bonne nutrition, éliminer l'obstacle papillaire persistant. Durant la première phase du début des formes précocement sévère de la PAB, des complications localisées ou générales pourront se manifester. La sévérité clinique correspond au degré de déficience du pancréas évaluée par le score de Balthazar. Ce score est généralement compris entre 5 et 8.

La morbidité majeure est liée soit à un dysfonctionnement organique simple ou bien complexe, ou à un syndrome de défaillance multi-viscérale avec hypoxémie. Il peut également présenter une septicémie pancréatique ou bien un syndrome coronarien aigu; ce dernier nécessite une intervention chirurgicale urgente.

Ces formes nécessitent une prise en charge en soins intensifs. Au début des formes sévères, il existe une grande compromission de conditions générales par toxicité précoce – lésion enzymatique et taux élevé de mortalité (plus de 10%). La phase ultérieure de la maladie (troisième et quatrième semaine) se caractérise par des complications septiques du pancréas ou du fluide péri pancréatique – collections nécrotiques.

Dans les formes sévères, l'approche thérapeutique est plus complexe par une réanimation liquidienne précoce pour corriger l'hypovolémie. L'hypovolémie est due, dans l'ensemble, à une extravasation du troisième espace, secondaire aux vomissements, aux pertes respiratoires et à la diaphorèse. Le but spécifique de la correction de l'hypovolémie consiste à éviter la diminution de la macro / microcirculation et ensuite la cascade d'événements conduisant à la nécrose pancréatique [101].

La réhydratation précoce est l'approche thérapeutique de première intention et devrait être suffisante dans les formes sévères de la maladie pour qu'elle soit bénéfique. La réanimation liquidienne avec la solution de Ringer lactée a montré de bons résultats sur l'évolution de la pancréatite aiguë sévère se basant sur l'équilibre du pH avec une réduction de l'évolution du SIRS et la valeur de la CRP.

Des soins attentifs doivent être recommandés lors d'une administration précoce de liquide: nous devrions soigneusement considérer la nécessité ou pas d'une réhydratation agressive au début car il peut être préjudiciable chez les patients sans épuisement des fluides ou avec comorbidités cardiovasculaires chroniques.

Le contrôle de la douleur peut être fait, en fonction de la gravité de la douleur, par l'administration d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) en première intention, puis les opioïdes. Le contrôle pharmacologique de la douleur devrait être considéré comme un objet très important dans le traitement de PA. [102]

Dans le programme thérapeutique de PA, le repos intestinal est la mesure la plus discutable, ce choix thérapeutique est toujours présent dans la pratique clinique (mais pas avec une diffusion définie) et a été également rapporté dans la littérature.

La physiopathologie de la pancréatite aiguë sévère prouve que le risque de collections de nécroses de fluide pancréatique et péripancréatique sont dues à la translocation bactérienne, cette dernière est causée par l'échec de l'intégrité de la barrière intestinale par modifications morphologiques de l'intestin associées au jeun, on note une prolifération bactérienne, une modification de la motilité, et une immunosuppression.

Plusieurs études montrent que la nutrition entérale dans la pancréatite aiguë sévère (comme la nutrition parentérale), devrait être utilisée avec l'évolution favorable de la maladie.

La grande variété de pancréatites aiguës en ce qui concerne le degré de gravité, le type de complications et les comorbidités des patients rend difficile le choix entre une nutrition entérale ou parentérale.

En résumé, les directives italiennes recommandent l'utilisation de nutrition entérale plutôt que la nutrition parentérale dans la pancréatite aiguë sévère. on pourrait négliger la nutrition chez certains patients en cas de doute de diagnostic. [102]

L'utilisation d'antibiotiques dans les PAB est toujours en discussion. Il y en a deux points pertinents à ce sujet: le premier point tout à fait défini est le traitement d'une infection déjà présente ne nécessitant qu'un bon choix d'antibiotiques. D'autre part, l'utilisation prophylactique d'antibiotiques est controversée.

Durant l'évolution de la pancréatite aiguë sévère, l'objectif principal d'une utilisation prophylactique d'antibiotiques est d'éviter la contamination des collections nécrotiques pancréatiques ou péripancréatiques. Donc les antibiotiques employés doivent avoir une activité

antimicrobienne bien définie, telle que le taux de pénétration, le taux de persistance et les concentrations thérapeutiques dans la zone nécrotique.

Une étude réalisée il y a plusieurs années avait suggéré l'utilisation de la pefloxacin et métronidazole ou, à des degrés divers, imipénème et mezlocilline. [102]

En conclusion, l'utilisation prophylactique des antibiotiques dans la PA devrait être initiée à l'admission, car la moitié des complications infectieuses surviennent dans les premiers jours de la maladie, et doit être poursuivie pendant 14 jours.

Dans l'approche thérapeutique spécifique médicale de l'PA, il existe trois médicaments largement utilisés: antiprotéases, somatostatine et octréotide. L'utilisation d'antiprotéases donne des résultats très discutables.

La somatostatine et l'octréotide développent une action positive d'inhibition de sécrétion pancréatique, mais ils sont également des vasoconstricteurs splanchniques avec hypoperfusion du pancréas pouvant favoriser la nécrose pancréatique. Donc son emploi est controversé.

En résumé, l'approche thérapeutique des PAB se développe habituellement en deux phases suivant l'évolution de la maladie. L'évolution des formes légères à modérées vers l'apparition de la maladie (première phase), le traitement comprend simplement une réhydratation intraveineuse et un contrôle des douleurs abdominales.

Dans les formes sévères, le début de la phase thérapeutique consiste en des soins intensifs, une réhydratation initiale, une réanimation agressive, des stéroïdes à faible dose, des anticoagulants pour des propriétés anti-inflammatoires, correction de l'hypoxémie, nutrition entérale pour préserver l'intégrité intestinale et une antibiothérapie prophylactique. En conclusion durant cette première phase des formes sévères, le but essentiel des soins intensifs, est de contrôler les conditions générales et évaluer les risques éventuels d'une défaillance d'organe. [102]

Dans la PAB, le contrôle de la perméabilité papillaire et, si nécessaire, et son traitement avec CPRE/SE, peuvent être considérés comme la pierre angulaire du programme thérapeutique basé sur la confirmation par des examens instrumentaux (Echographie, cholangiopancréatographie par résonance magnétique) de l'obstacle papillaire (calculs, boues, sclérose papillaire, etc.) ou, si présence de choléstase ou cholangite.

Les CPER / SE peuvent assurer le flux papillaire et le nettoyage du canal biliaire en cas de présence de lithiase, de boue, ou d'une microlithiase. Suivant ces généralités sur la physiopathologie de la pancréatite aiguë biliaire, l'utilisation thérapeutique des CPER / SE repose sur plusieurs données à évaluer:

- a) Confirmation d'un obstacle papillaire, persistant ou transitoire, généralement du à une lithiase biliaire.
- b) Indication de la procédure: quels patients (avec PAB) doivent être soumis à SE
- c) Calendrier de la procédure.
- d) Complications.

L'étiologie biliaire de la pancréatite peut être établie dès l'apparition des premiers symptômes par une échographie abdominale, évaluant la vésicule biliaire et le canal biliaire à la recherche d'une dilatation (> 8 mm) d'une lithiase, calculs biliaires, boue, et /ou microlithiase en plus d'un bilan hépatique / index de cholestase, taux sérique du calcium et des lipides à jeun.

L'étude diagnostique en deuxième lieu, c'est-à-dire la cholangiopancréatographie par résonance magnétique et / ou l'échographie endoscopique devrait habituellement confirmer l'origine biliaire de la pancréatite chez la majorité des patients.

Chez une minorité de patients, l'étiologie de la pancréatite reste inexplicée. Mais la réponse à la question suivante reste compliquée: quels patients devrait être soumis à CPRE / SE ?.

Le choix des patients pour CPRE / SE et le temps idéal pour la faire pour la PAB est de nos jours encore controversé malgré de nombreuses années depuis son introduction dans le programme thérapeutique. Il existe de nombreuses études dans la littérature sur ce sujet. Certains d'entre eux sont maintenant «historiques»: Neoptolemos, Fan, Nowak, Folsch [101].

Une revue systématique récente a été publiée [102]. La conclusion de ces études s'accordent sur certains points:

+Une CPRE / SE précoce n'a pas d'avantage pour les patients atteints de pancréatite légère, et n'est souvent pas indiqué.

+ Une CPRE / SE précoce peut être indiquée chez les patients atteints d'une maladie grave, obstruction biliaire ou cholangite

Dans une revue [102] a été cité également que le début de la CPRE / SE pourrait réduire les complications chez les patients avec une pancréatite sévère.

Tse F et al. a publié dans 'cochrane database Systematic Review'. Leur conclusion est que le début de la CPRE / SE ne modifie pas significativement la mortalité, la survenue des complications locales ou générales. Cependant, la CPRE / SE devrait être recommandée pour tout patient atteint de pancréatite sévère ou modérée avec obstruction papillaire ou cholangite associée.

En conclusion, cette procédure thérapeutique peut être proposée à tous les patients avec pancréatite aiguë biliaire sévère, précocement sévère, en cas de récurrence et également chez la majorité des patients présentant une pancréatite modérée.

De toute évidence, tous ces patients doivent être diagnostiqués par une CPRE ou une échographie pour la confirmation d'un obstacle lithiasique papillaire ou du canal biliaire, qui est parfois compliqué par une angiocholite. Le calendrier de la CPRE / SE après identification des patients doit être choisi dans les 48 à 72 premières heures du début de la pancréatite. Enfin, la CPRE / SE chez tout patient atteint de pancréatite aiguë sévère, de conditions générales altérées

ou bien nécessitant des soins intensifs avec ventilation assistée mais peut être une procédure à haut risque. Ce choix thérapeutique est très difficile et sans consentement mondial.




Figure 26 :Endoscopie per opératoire, Technique du « baiser »[103]

Les complications de la CPRE / SE ne sont pas inhabituelles. Ils incluent les perforations, saignements, infections. Certaines données de la littérature montrent que le taux d'incidence de ces complications est environ 10%. Les complications avec une morbidité majeure atteignent 1,5% et une mortalité inférieure à 0, 5%.

Des données plus récentes montrent que la majorité des événements sont de gravité minime à modérée; mais d'autre part, le taux global de complications ne diminue pas. Il est

nécessaire de pratiquer une cholécystectomie par laparoscopie pendant la même hospitalisation pour compléter le traitement des calculs biliaires chez tous les patients atteints de pancréatite avec une pathogenèse biliaire, soumis à une CPRE / SE ou pas. Le moment de La cholécystectomie laparoscopique est liée à l'évolution aiguë de la pancréatite car il est préférable d'attendre l'amélioration de l'état général.

La base des perspectives thérapeutiques dans les pancréatite aigues biliaires sévères est liée au degré d'atteinte du parenchyme pancréatique et des tissus péripancréatiques. La phase avancée de la pancréatite aiguë sévère est caractérisé par un syndrome de réponse anti-inflammatoire compensatrice, avec un risque d'infection, nécrose et aggravation de la défaillance de l'organe. [103]

La pancréatite aiguë sévère à un stade avancé peut voir certaines évolutions: Eviction d'une défaillance précoce d'organes par une réanimation adéquate, mais la phase tardive de la maladie se complique souvent d'une infection des tissus nécrotiques péripancréatiques qui aggrave l'état générale, une défaillance organique persistante nécessite également le contrôle du risque d'infection des collections – par un examen bactériologique après aspiration à l'aiguille fine, par un scanner avec injection de produit de contraste qui montre des bulles de gaz; dans ce dernier cas, des procédures interventionnelles devrait être employées.

La prévalence des formes nécrosantes est comprise entre 15 et 20%, caractérisée par une hypoperfusion du parenchyme sur le scanner avec injection de produit de contraste (score de Balthazar) [89]. Le processus nécrotique implique le parenchyme glandulaire et les tissus péripancréatiques avec une extension très variable. L'œdème interstitiel est étendu et s'associe à la nécrose pancréatique et péripancréatique pendant une courte durée allant de 48 à 72 heures après le début de l'inflammation. Ces tissus inflammatoires et nécrotiques favorisent les collections liquidiennes aigues et formation de tissu dévitalisé.

L'évolution ultérieure de ces collections liquidiennes est caractérisée par la démarcation des tissus viables et mortes par un tissu de granulation. Leurs prise en charge est la plus longue et leurs thérapie est la plus débattue. Elle comprend des éléments spécifiques pour décision chirurgicale basés sur les questions suivantes:

+Combien de temps de contrôle et d'observation d'une collection de fluide nécrotique non compliquée devrait être prolongés?

+Comment différencier entre une nécrose pancréatique infectée et stérile?

+Chez certains patients atteints de nécrose infectée, le traitement chirurgical est t-il retardé ?

+ Quel est le meilleur traitement d'une collection de fluide nécrotique compliquée ?




Figure 27: Drainage percutané des coulées de nécrose[104].

Le programme thérapeutique doit suivre l'évolution de la PAB, à la phase toxique précoce (les deux premières semaines), outre le contrôle et le traitement par CPRE / SE des papillaires et du canal biliaire commun lithiasique, afin d'obtenir un flux biliaire normale ainsi qu'un nettoyage du canal biliaire commun, le but thérapeutique central est d'améliorer les conditions générales qui peuvent avoir une implication sévère, et éviter le début du SRIS redouté et minimiser la mortalité se basant sur le SDMPV. Donc dans cette phase toutes les interventions chirurgicales doivent être retardées.

La phase qui suit et qui commence à partir de la troisième / la quatrième semaine est caractérisée par une collection de fluide nécrotique avec présence ou pas de complications septiques, telle que la nécrose pancréatique infectée.

- a) Combien de temps de contrôle et l'observation des collections nécrotiques non compliqués peut être prolongé?

Les collections peuvent être également soumises à une procédure conservatrice pendant plusieurs semaines (quatre / huit semaines) si absence de complication. La conclusion pathologique de la persistance d'une collection liquidienne péripancréatique généralement supérieur à 5 cm peut être due un pseudokyste postnécrotique aigu. Pour les collections asymptomatiques des manœuvres chirurgicales et un drainage percutané devront être évités à cause du risque d'infections secondaire chez certains patients présentant un état générale très altéré persistant et en cas de défaillance d'organe, des procédures interventionnelles peuvent être indiqué même si le liquide de la collection nécrotique est stérile. [104]

- b) Comment différencier entre la nécrose pancréatique infectée et stérile? La première étape consiste à évaluer les signes cliniques et les signes biologiques du sepsis.

L'infection peut être suspectée sur un scanner avec injection de produit de contraste qui montre des bulles dans les collections. En cas de doute l'aspiration à l'aiguille fine doit être effectué, en raison d'un risque potentiel d'infections secondaires.

- c) Chez certains patients atteints de nécrose infectée, est ce que le traitement chirurgical peut être retardé ?

En générale, les interventions chirurgicales sont indiquées chez les patients présentant des collections liquidienne septiques et nécrotiques afin d'éviter la détérioration de l'état générale du au sepsis. Une complication septique des tissus nécrosés pancréatiques et péripancréatiques peut survenir au début de la maladie et entrainer un abcès pancréatique avec une aggravation des conditions générales. Dans ce cas, le drainage de la collection doit être obligatoire par voie percutanée, endoscopique ou ouverte.

Par conséquent, le traitement contre l'infection à l'échelle internationale, chez les patient avec un état général conservé, peut retarder la procédure chirurgicale de quelques semaines lorsque la collection est devenue fermée. La chirurgie dans la première phase de la maladie (les

deux premières semaines) à un taux de mortalité très élevé (75%), généralement à cause de la nécrosectomie pour les collections infectées, mais si elle est retardée plus de quatre semaines après le début, la mortalité diminue à 5 % [105].

Quel est le meilleur traitement d'une collection de fluide nécrotique compliquée ?

Le traitement des collections nécrotiques pancréatiques et péripancréatiques au cours de la dernière décennie est orienté progressivement vers des procédures chirurgicales mini-invasives. Il n'y a pas dans ces programmes thérapeutiques, des indications et des interventions chirurgicales uniformément normalisés et utilisés. Auparavant, il a été proposé et utilisé pour des collections nécrotiques infectées, la nécrosectomie ouverte avec débridement complet, nécrosectomie, système de lavage rétropéritonéal et drains dans un sac. La mortalité était de 25%.

D'autres procédures possibles ont également été proposées: intervention par coelioscopie avec une mortalité de 11% et intervention à abdomen ouvert et une autre laparotomie prévue en second temps avec une mortalité élevée de 70%.

La nécrosectomie récente par une chirurgie mini invasive est de plus en plus répandue: nécrosectomie rétropéritonéale percutanée mini-invasive, débridement rétropéritonéal avec une vidéo-assistée (accompagné d'une élimination de certaines pièces de nécrose moins adhérente et réduction du risque de saignement, le tissu nécrotique restant peut être résorbé), basée sur une approche progressive peu invasive, une nécrosectomie transluminale endoscopique (NTE), un drainage percutané-nasal.

La comparaison entre la nécrosectomie à ciel ouvert et l'approche progressive par un drainage percutané ou transgastrique accompagné d'une nécrosectomie guidée par un drain a révélé des complications mineures. [105]

En résumé, au cours des procédures mini-invasives on pourra réévaluer par le drainage simple percutané des collections nécrotiques septiques. Nous devrions garder à l'esprit que cela peut être une première étape du programme thérapeutique, tenant compte de la possibilité de résorption du tissu nécrotique; et cela se produit essentiellement si le drainage de la collection est incomplet, il est parfois devrait être possible de réaliser une nécrosectomie complète.

Des données récentes de la littérature ont montré le nombre élevé de patients traités avec drainage percutané (22 – 55%) et taux de réussite technique de 99% [106]. En conclusion, il n'est pas certain que la meilleure procédure de traitement des collections pancréatiques septiques nécrotiques. Aucune approche ne peut être juste et convient à tous les patients. Les procédures de drainage des collections et / ou de débridement des tissus nécrotiques / septiques parmi les nombreux choix thérapeutiques proposés doivent être adaptées en fonction de la présentation du patient et de son anatomie. La nécrosectomie ouverte est la dernière option après l'échec de procédures moins invasives.

L'algorithme de gestion des collections nécrotiques pancréatiques et de fluide péripancréatique est présenté à la figure 28.




Figure 28 : Gestion des rassemblements pancréatiques – péripancréatiques. [106]

Les collections liquidiennes nécrotiques non infectées pancréatiques et péripancréatiques peuvent avoir une double évolution: la résorption des collections et l'évolution favorable de la maladie ou la formation de pseudokystes postnécrotiques aigus. Deux facteurs influencent cette évolution, la taille et le mode d'apparition des collections.

Les collectes nécrosées non compliquées du pancréas peuvent développer une séparation des tissus à paroi fibreuse et à contenu liquide (pseudokyste postnécrotique aiguë). L'évolution d'une lésion avec une paroi fibreuse peut être complète en plusieurs semaines (12-16

semaines). Les petits kystes de moins de 5 à 6 cm peuvent montrer une résorption spontanée en plusieurs mois sans apparence clinique.

L'incidence des pseudokystes postnécrotiques aigus est faible et se situe entre 5 et 16% [107]. Pseudokystes de plus de 6 – 7 cm, ou symptomatiques, ou persistants sur plusieurs mois nécessitent un traitement chirurgical.

Le choix des procédures doit être guidé par une caractéristique pathologique fondamentale: la connexion avec les canaux pancréatiques. Si la connexion est présente drainage simple percutané guidé par échographie ou tomodensitométrie devrait être évitée en raison du risque de fuite persistante de suc pancréatique du drain, d'infection et de possibles changements répétés de drain. Les procédures à proposer sont chirurgicales avec une approche ouverte ou mini-invasive (laparoscopique, endoscopique):

Concernant le pseudokyste on devrait toujours établir une connexion digestive prolongée telles que l'anastomose ou les fistules. Le choix du tube digestif pour le drainage chirurgical est basé sur le site de développement du pseudokyste: petit sac, foramen épiploïque, compartiment infracolique, ecc... Les organes intestinaux habituellement utilisés pour l'anastomose sont l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle: la kysto-jéjunostomie, kysto-gastrostomie, kysto-duodénostomie [108].




Figure 29 : Types de cholécystéctomie[104]

Dans notre étude le drainage pancréatique était réalisé chez 24.1% ,35.1% dans la série de SORAN et Coll [21], 19,9% dans la série BECHIMOL et Coll [22] ,20,2% dans la série de MAJDOUBA et al [23] ,15.9% dans la série de TAYAB MUSTAPHA [24] et 30,9% dans la série de AYNAOU [25].

Le geste biliaire le plus réalisé dans notre série et ainsi que dans les autres séries était la cystectomie avec des pourcentages allant de 60,3% à 80,2%.

Tableau XVIII: le pourcentage d'utilisation des différents types de chirurgie dans les différentes série

Type de chirurgie		Notre série	SORAN et Coll [21]	BECHIMO L et Coll [22]	MAJDOUB A et al [23]	TAYAB MUSTAPH A [24]	AYNAO U [25]
Chirurgie pancréatique : drainage percutané guidé par le scanner		24.1%	35.1%	19.9%	20.2%	15.9%	30.9%
Chirurgie biliaire	cholecystéctomie	70.6%	80.2%	75.5%	74.6%	60.3%	69.8%
	Drainage du cholédoque	18.5%	20.2%	24.1%	36%	34.1%	20.2
	Derivation duodéno pancréatique	1.8%	2.2%	3.1%	4%	2.6%	3.2%
	Drain de kehr	13%	14.2%	20.3%	10.2%	6.5%	14%
	Sphinctérectomie endoscopique	3.7%	2.8%	6.6%	5.5%	11.2%	2.2%



Conclusion



La pancréatite aigue biliaire est une pathologie sévère qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire.

Le diagnostic positif repose sur la présence d'un syndrome douloureux abdominal, et l'existence d'une hyperlipasémie. Si les diagnostics cliniques et biologiques sont imprécis, la tomодensitométrie est justifiée. L'évaluation de la gravité initiale, qui doit être faite le plus précocement possible, repose sur la surveillance clinique et biologique surtout par la CRP à 48 heures, et sur les scores clinico-biologiques spécifique notamment le score de RANSON à l'admission et durant l'évolution, et aussi sur l'index de sévérité tomодensitométrique de Balthazar.

Le traitement est d'abord médical et conservateur, et vise à prévenir et à traiter les complications systémiques telles que les défaillances viscérales. Le traitement chirurgical précoce n'a d'indication que s'il y a un doute diagnostic ou une complication ; sinon la chirurgie est différée car la chirurgie précoce est susceptible d'aggraver le pronostic. La cholangiopancréatographie rétrograde associée à la sphinctérotomie, est réservée aux formes les plus sévères de pancréatite aigue biliaire. La cure chirurgicale de la lithiase biliaire se fera à distance en dehors de la survenue des complications. Le drainage percutané est un traitement des pseudokystes des pancréas quand ils se compliquent, et aussi des abcès pancréatiques pour lesquels il est efficace.



RESUMES



Résumé

Notre travail est une étude rétrospective de 54 cas de patients présentant une pancréatite aigue biliaire, hospitalisés au sein du service de chirurgie viscérale du centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech, sur une durée d'un an depuis janvier à decembre 2017.

L'age moyen était de 48,3 ans avec des extremes allant de 28 a 75 ans, le sexe féminin prédominait avec un pourcentage de 81%, le tabac était l'antécédent médical le plus fréquent (17%), la lithiase urinaire était l'antécédent chirurgical le plus fréquent (83.3%).

Sur le plan clinique la douleur était le maitre symptome, sa localisation épigastrique était la plus fréquente avec un pourcentage de 90.7%, l'examen clinique retrouve souvent une sensibilité épigastrique (96.3%).

La lipasémie était supérieure à 3 fois la normale dans 86.8%, le stade de la pancréatite aigue le plus fréquent à la TDM était le stade C (42%), avec une lithiase biliaire associée dans 74.1%.

Le traitement médical était administré chez tout les malades, le traitement chirurgical consistait à une cholecystéctomie dans 70.6%, un drainage du cholédoque dans 18.5%, une dérivation duodéno pancréatique dans 1.8%, un drainage de Kehr dans 13% et une sphinctérotomie endoscopique dans 3.7%.

L'évolution à court terme était marquée par l'amélioration clinique, en effet la douleur a disparu chez tous les malades. L'évolution a long terme était favorable chez 81.5%, tandis que le reste présentait des complications dont la récidence était la plus fréquente (5.5%).

Abstract

Our work is a retrospective study of 54 cases of patients with acute biliary pancreatitis hospitalized in the department of visceral surgery of the Mohamed VI University Hospital Center in Marrakech, for a period of one year from January to December 2017.

The mean age was 48.3 years with extras ranging from 28 to 75 years, female predominated with a percentage of 81%, tobacco was the most common medical history (17%), urolithiasis was the most common surgical history (83.3%).

Clinically, pain was the main symptom, epigastric localization was the most common with a percentage of 90.7%, clinical examination often found epigastric sensitivity (96.3%).

Lipaseemia was greater than 3 times normal in 86.8%, the stage of acute pancreatitis most common on CT was stage C (42%), with associated gallstone disease in 74.1%.

Medical treatment was administered to all patients, surgical treatment consisted of 70.6% cholecystectomy, 18.5% common bile duct drainage, 1.8% pancreatic duodeno-drainage, 13% Kehr drainage, and 3.7 endoscopic sphincterotomy. %.

The short-term evolution was marked by the clinical improvement, indeed the pain disappeared in all the patients. The long-term outcome was favorable in 81.5%, while the rest had complications whose recurrence was the most frequent (5.5%).

ملخص

عملنا هو عبارة عن دراسة رجعية لـ 54 حالة مرضى مصابين بالتهاب البنكرياس المراري الحاد في قسم جراحة الجهاز الهضمي في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش ، لمدة عام واحد من يناير إلى ديسمبر 2017.

كان متوسط العمر 48.3 سنة مع اعمار تتراوح بين 28 إلى 75 سنة ، وكانت الغالبية إنثاء بنسبة 81 % ، وكان التدخين هو السابقة الطبية الأكثر شيوعا (17 %) ، وكان حصى الجهاز البولي هو السابقة الجراحية الأكثر شيوعا (83.3 %).

سريريا ، كان الألم هو العرض الرئيسي ، حيث كان الموقع الشرسوفي شائعا بنسبة 90.7 % ، ووجد الفحص السريري حساسية شرسوفيا (96.3 %).

كانت اللياسيميا أكبر من 3 مرات في 86.8 % ، وكانت مرحلة التهاب البنكرياس الحاد الأكثر شيوعا على السكانير المرحلة س (42 %) ، مع وجود مرض المرارة في 74.1 %.

تم إعطاء العلاج الطبي لجميع المرضى ، وكان العلاج الجراحي يتكون من استئصال المرارة بنسبة 70.6 % ، و 18.5 % من صرف القناة الصفراوية العامة ، و 1.8 % من صرف البنكرياس ، و 13 % من صرف كيهز ، و 3.7 % من استئصال العاصرة بالمنظار.

تميز التطور على المدى القصير بالتحسن السريري ، وبالفعل اختفى الألم عند جميع المرضى. كانت النتيجة على المدى الطويل ايجابية في 81.5 % ، في حين أن البقية كانت لها مضاعفات كان تكرار نفس المرض الأكثر شيوعا (5.5 %).



Références



1. **van Brunschot S, van Grinsven J, van Santvoort HC, et al.**
Endoscopic or surgical step-up approach for infected necrotising pancreatitis: a multicentre randomised trial. Lancet 2018;391:51–8.
2. **Mowery NT, Bruns BR, MacNew H, et al.**
Surgical management of pancreatic necrosis: a practice management guideline from the Eastern Association for the surgery of trauma. J Trauma Acute Care Surg 2017;83:316–27.
3. **Buxbaum J, Quezada M, Chong B, et al.**
The Pancreatitis Activity Scoring System predicts clinical outcomes in acute pancreatitis: findings from a prospective cohort study. Am J Gastroenterol 2018;113(5):755–64.
4. **de-Madaria E, Herrera-Marante I, Gonzalez-Camacho V, et al.**
Fluid resuscitation with lactated Ringer's solution vs normal saline in acute pancreatitis: a tripleblind, randomized, controlled trial. United European Gastroenterol J 2018;6(1): 63–72.
5. **Dhar VK, Sutton JM, Xia BT, et al.**
Fistulojejunostomy versus distal pancreatectomy for the management of the disconnected pancreas remnant following necrotizing pancreatitis. J Gastrointest Surg 2017;21:1121–7.
6. **Gray H.**
Anatomy of Human Body. Philadelphia: Lea & Febiger; 1918.
7. **Lahlaoui A.**
Anatomie topographique. Applications chirurgicales. Volume II: Abdomen. Rabat: Livres Ibn Sina; 1986.
8. **Netter FH.**
Atlas d'anatomie humaine. 3ème éd. Paris: Masson; 2004.
9. **Park JG, Kim KB, Han JH, et al.**
The usefulness of early endoscopic ultrasonography in acute biliary pancreatitis with undetectable choledocholithiasis on multidetector computed tomography. Korean J Gastroenterol. 2016;68:202–209.
10. **Vege SS, DiMaggio MJ, Forsmark CE, et al.**
Initial medical treatment of acute pancreatitis: American Gastroenterological Association Institute Technical Review. Gastroenterology 2018;154(4):1103–39

11. Frossard JL, Hadengue A, Pastor CM.

New serum markers for the detection of severe acute pancreatitis in humans. 2001;164:162–70.

12. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, et al.

American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 2013;108(9): 1400–15, 1416.

13. Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines.

IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology 2013;13(4Suppl 2):e1–15.

14. Singh VK, Gardner TB, Papachristou GI, et al.

An international multicenter study of early intravenous fluid administration and outcome in acute pancreatitis. United European Gastroenterol J 2017;5(4):491–8

15. Koutroumpakis E, Slivka A, Furlan A, et al.

Management and outcomes of acute pancreatitis patients over the last decade: a US tertiary-center experience. Pancreatology 2017;17(1):32–40.

16. Guoqian D, Mingfang Q, Wang C, et al.

The safety and utility of pancreatic duct stents in the emergency ERCP of acute biliary pancreatitis but difficult sphincterotomy. Hepatogastroenterology. 2012;59:2374–2376.

17. Peery AF, Crockett SD, Barritt AS, et al.

Burden of gastrointestinal, liver, and pancreatic diseases in the United States. Gastroenterology 2015;149(7): 1731–41.e3.

18. Christian JB, Arondekar B, Buysman EK, et al.

Determining triglyceride reductions needed for clinical impact in severe hypertriglyceridemia. Am J Med 2014;127(1):36–44.e1.

19. Spanier B, Bruno MJ, Dijkgraaf MG.

Incidence and mortality of acute and chronic pancreatitis in the Netherlands: a nationwide record-linked cohort study for the years 1995–2005. World J Gastroenterol. 2013;19:3018–3026.

20. Yadav D, Lowenfels AB.

Trends in the epidemiology of the first attack of acute pancreatitis: a systematic review. Pancreas. 2006;33:323–330.

21. Soran Atilla , Chelluri Lakshmipathi , Lee Kenneth K.W ,Tsherman Samuel A.
Outcome and quality of life of patients with acute pancreatitis requiring intensive care. Journal of surgical research, Vol.91, No.1, JUNE 1, 2000, pp: 89 94
22. Benchimol D. , Firtion O. , Berder J.M. , Chazal M. , Bourgeon A.
Richelme H.Pancréatites aigues traitées en milieu chirurgical : à propos de 57 cas. Journal de chirurgie 1996,Vol.133,No.F,pp.208 213.
23. Majdoub A, et al.
Les pancréatites aiguës biliaires : facteurs pronostiques et apport des scores de gravité. Anesth Reanim. (2016)
24. Taib Mustapha.
La pancréatite aigue, service de chirurgie générale ; Hôpital Ain Taya, 2006
25. Aynaou Mohammed
Facteurs prédictifs de mortalité au cours des pancréatites aiguës A propos de 170 cas Thèse N° 026/15
26. El-Dhuwaib Y, Deakin M, David GG, Durkin D, Corless DJ, Slavin JP.
Definitive management of gallstone pancreatitis in England. Ann R Coll Surg Engl 2012;94:402—6.
27. Phillip V, Schuster T, Hagemes F, Lorenz S, Matheis U, Preinfalk S, Lippl F, Saugel B, Schmid RM, Huber W.
Time period from onset of pain to hospital admission and patients awareness in acute Pancreas. 2013;42:647 654.
28. Bakker OJ, van Brunschot S, Farre A, et al.
Timing of enteral nutrition in acute pancreatitis: meta-analysis of individuals using a single-arm of randomised trials. Pancreatology 2014;14:340—6.
29. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al.
Classification of acute pancreatitis-2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut 2013;62: 102—11.

30. Forsmark CE, Baillie J.
AGA Institute technical review on acute pancreatitis. Gastroenterology 2007;132:2022–44.
31. Burstow MJ, Yunus RM, Hossain MB, Khan S, Memon B, Memon MA.
Meta-analysis of Early Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) ± Endoscopic Sphincterotomy (ES) Versus Conservative Management for Gallstone Pancreatitis (GSP). Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2015;25: 185–203.
32. Johnstone M, Marriott P, Royle TJ, et al.
The impact of timing of cholecystectomy following gallstone pancreatitis. Surgeon 2014;12:134–40.
33. Surlin V, Saftoiu A, Dumitrescu D.
Imaging tests for accurate diagnosis of acute biliary pancreatitis. World J Gastroenterol 2014;20:16544–9.
34. European Association for the Study of the liver (EASL).
EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones. J Hepatol 2016;65:146–81.
35. Agostini S., Garcon S., Durieux O., Peretti P.
Aspect du pancréas normal: Variantes et malformations. J. Radiol 2005; 86:719–32.
36. Laurens B., Leroy C., Andre A., Etienne B. & Ernst O.
Imagerie des pancréatites aiguës. J Radial 2005; 86:733–47.
37. Roy C., Pflieger D., Vasilescu C., Buy X.
Imagerie du pancréas. Hépatologie 2000 ,[7-102-A-10].
38. Raghu MG., Wig JD., Kochhar R., Gupta D., Yadav TD., Agarwal R., Kudari A.K.
Lung Complications in Acute Pancreatitis. JOP. J Pancreas 2007; 8(2):177–185.
39. Browne GW., Pitchumoni C.S.
Pathophysiology of pulmonary complications of acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2006 ;12(44):7087–7096.
40. Pastor CM., Matthay MA. & Frossard J.L.
Pancreatitis–Associated Acute Lung Injury. CHEST 2003; 124:2341–2351.

41. Working Group IAP/APA

Acute Pancreatitis Guidelines / Pancreatology 13 (2013)

42. Bollen TL, Singh VK, Maurer R, Repas K, van Es HW, Banks PA, et al.

A comparative evaluation of radiologic and clinical scoring systems in the early prediction of severity in acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 2012;107:612–9.

43. Wang SQ, Li SJ, Feng QX, Feng XY, Xu L, Zhao QC.

Overweight is an additional prognostic factor in acute pancreatitis: a meta-analysis. Pancreatology 2011;11:92–8.

44. Wu BU, Bakker OJ, Papachristou GI, Besselink MG, Repas K, Van Santvoort HC, et al.

Blood urea nitrogen in the early assessment of acute pancreatitis: an international validation study. Arch Intern Med 2011;171:669–76.

45. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine consensus conference:

definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Crit Care Med 1992;20: 864–74.

46. Mofidi R, Duff MD, Wigmore SJ, Madhavan KK, Garden OJ, Parks RW.

Association between early systemic inflammatory response, severity of multiorgan dysfunction and death in acute pancreatitis. Br J Surg 2006;93:738–44.

47. Mikolasevic I, Milic S, Orlic L, et al.

Metabolic syndrome and acute pancreatitis. Eur J Intern Med. 2016;32:79–83.

48. Singh VK, Wu BU, Bollen TL, Repas K, Maurer R, Morteale KJ, et al.

Early systemic inflammatory response syndrome is associated with severe acute pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:1247–51.

49. Rashid N, Sharma PP, Scott RD, et al.

Severe hypertriglyceridemia and factors associated with acute pancreatitis in an integrated health care system. J Clin Lipidol. 2016;10(4):880–890.

50. Ducarme G, Maire F, Chatel P, Luton D, Hammel P.

Acute pancreatitis during pregnancy: a review. J Perinatol 2014;34:87–94.

51. Li A, Cao F, Li J, et al.

Step-up mini-invasive surgery for infected pancreatic necrosis: results from prospective cohort study. Pancreatology 2016;16:508–14.

52. Papachristou GI, Muddana V, Yadav D, O'Connell M, Sanders MK, Slivka A, et al.
Comparison of BISAP, Ranson's, APACHE-II, and CTSI scores in predicting organ failure, complications, and mortality in acute pancreatitis.
Am J Gastroenterol 2010;105:435–41
53. Wu D, Hwang JQ, Gardner TH, et al.
Lactated Ringer's solution reduces systemic inflammation compared with saline in patients with acute pancreatitis. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2011;9:710–7.
54. Delrue LJ, De Waele JJ, Duyck PO.
Acute pancreatitis: radiologic scores in predicting severity and outcome.
Abdom Imaging 2010;35(3):349–61
55. Papachristou GI, Muddana V, Yadav D, O'Connell M, Sanders MK, Slivka A, et al.
Comparison of BISAP, Ranson's, APACHE II, and CTSI scores in predicting organ failure, complications, and mortality in acute pancreatitis.
Am J Gastroenterol 2010;105(2):435–7.
56. Shen HN, Wang WC, Lu CL, Li CY.
Effects of gender on severity, management and outcome in acute biliary pancreatitis. *PLoS One* 2013;8 [e57504].
57. Roberts SE, Akbari A, Thorne K, Atkinson M, Evans PA.
The incidence of acute pancreatitis: impact of social deprivation, alcohol consumption, seasonal and demographic factors. *Aliment Pharmacol Ther* 2013;38:539–48.
58. Marc Barthet.
Conférence de consensus : Pancréatite aigue *Gastroenterol clin biol.* 2001– 25 ; 1515–1516.
59. Petrov MS.
Moving beyond the “pancreatic rest” in severe and critical acute pancreatitis. *Crit Care* 2013;17:161.
60. Carr RA, Rejowski BJ, Cote GA, et al.
Systematic review of hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis: a more virulent etiology? *Pancreatology.* 2016;16(4):469–476.

61. vanGeenen EJ, van der Peet DL, Bhagirath P, Mulder CJ, Bruno MJ.
Etiology and diagnosis of acute biliary pancreatitis. Nat Rev GastroenterolHepatol 2010;7:495–502
62. Anderson K, Brown LA, Daniel P, Connor SJ.
Alanine transaminase rather than abdominal ultrasound alone is an important investigation to justify cholecystectomy in patients presenting with acute pancreatitis. HPB (Oxford) 2010;12:342–7.
63. Trna J, Vege SS, Pribramska V, et al.
Lack of significant liver enzyme elevation and gallstones and/or sludge on ultrasound on day 1 of acute pancreatitis is associated with recurrence after cholecystectomy: a population-based study. Surgery 2012;151:199–205.
64. Rebours V.
Actualités sur la prise en charge de la pancréatite aiguë. Rev Med Interne 2014;35:649–55.
65. Bakker OJ, van Brunschot S, Farre A, et al.
Timing of enteral nutrition in acute pancreatitis: meta-analysis of individuals using a single-arm of randomised trials. Pancreatology 2014;14:340–6.
66. Imamna T; Tanaka S; Yoshida H; Kitamna K.
Significiance of measurement og high sensitivity C- reactive protein in acute pancreatitis. Jgastroenterol 2002; 37(11); p:935–938.
67. Surlin V, Saftoiu A, Dumitrescu D.
diagnosis of acute biliary pancreatitis. World J Gastroenterol2014;20:16544–9.
68. Jeffrey RB Jr.
Sonography in acute pancreatitis. Radiol Clin North Am 1989;27:5–17.
69. Yoon HG, Moon JH, Choi HJ, et al.
Endoscopic papillary large balloon dilation for the management of recurrent difficult bile duct stones after previous endoscopic sphincterotomy. Dig Endosc. 2014;26:259–263.
70. Lee SP, Nicholls JF, Park HZ.
Biliary sludge as a cause of acute pancreatitis. N Engl J Med 1992;326:589–93.

71. Navarro-Sanchez A, Ashrafian H, Lalotis A, Qurashi K, Martinez-Isla A.
Single-stage laparoscopic management of acute gallstone pancreatitis: outcomes at different timings. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2016;15:297–301.
72. Waldman SD. The celiac plexus.
In: Pain review. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2017:117–118.
73. Dellinger EP, Forsmark CE, Laver P, et al.
Determinant-based classification of acute pancreatitis severity: an international multidisciplinary consultation. Ann Surg 2012;256(6):875–80.
74. Borreca D, Bona A, Bellomo MP, Borasi A, DE Paolis P.
Timing of cholecystectomy in acute biliary pancreatitis: is it still reasonable to wait? Minerva Chir 2016;7:31–7.
X
75. Reuther G, Kiefer B, Tuchmann
A. Cholangiography before biliary surgery: single shot MR cholangiography. Radiology 1996; 198:561–6.
76. Ali Majdoub, MounaOuaz, YassineMeksi, ImenBannour, Bechir Haddad
Les pancréatites aiguës biliaires : facteurs pronostiques et apport des scores de gravité. Anesthésie & Réanimation, Volume 2, Issue 4, July 2016, Pages 222–226
77. Chan YL, Chan ACW, Lam WWM.
Choledocolithiasis: comparison of MR cholangiography and endoscopie rétrograde cholangiography. Radiology 1996;200:85–9.
78. Soto JA, Barish MA, Yucel EK, Siegenberg D, Ferrucci JT, Chuttani R.
Magnetic résonance cholangiography: comparison with endoscopie rétrograde cholangiopancreatography. Gastroenterology 1996;110:589–97.
79. Dokmak S, Tetart A, Aussilhou B, et al.
Traitement conservateur chirurgical d'une déconnection canalaire pancréatique: la « French Reconnection ». Communication affichée P.292 JFHOD Paris 23–26 mars 2017.
80. Garip G, Sarandöl E, Kaya E.
Effects of disease severity and necrosis on pancreatic dysfunction after acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2013;19:8065–70.

81. Kumar N, Conwell DL, Thompson CC.
Direct endoscopic necrosectomy versus step-up approach for walled-off pancreatic necrosis: comparison of clinical outcome and health care utilization. Pancreas 2014;43:1334—9.
82.] Fischer TD, Gutman DS, Hughes SJ, Trevino JG, Behms KE.
Disconnected pancreatic duct syndrome: disease classification and management strategies. J Am Coll Surg 2014;219: 704—12.
83. Smit M, Buddingh KT, Bosma B, Nieuwenhuijs VB, Hofker HS, Zijlstra JG.
Abdominal compartment syndrome and intraabdominal ischemia in patients with severe acute pancreatitis. World J Surg 2016;40:1454—61.
84. Burstow MJ, Yunus RM, Hossain MB, Khan S, Memon B, Memon MA.
Meta-analysis of Early Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) ± Endoscopic Sphincterotomy (ES) Versus Conservative Management for Gallstone Pancreatitis (GSP). Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2015;25: 185—203.
85. Kuo V, Tarnasky PR.
Endoscopic management of acute biliary pancreatitis. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2013;23:749–768.
86. Bove V, Tringali A, Familiari P, et al.
ERCP in patients with prior Billroth II gastrectomy: report of 30 years' experience. Endoscopy. 2015;47:611–616.
87. Mounzer R, Langmead CJ, Wu BU, et al.
Comparison of existing clinical scoring systems to predict persistent organ failure in patients with acute pancreatitis. Gastroenterology 2012;142(7):1476–82 [quiz: e1415–76].
88. P Montravers, A. Benbara, H. Chemchick, N. Rkaiby.
Pancréatites aiguës. Congrès national d'anesthésie et de réanimation 2008. Les Essentiels, p. 539–551
89. EL AMARTI Lamiae.
La pancréatite aiguë grave :prise en charge en milieu de réanimation à propos de 40 cas thèse no :04/2011
90. Schepers NJ, Bakker OJ, Besselink MG, et al.
Early biliary decompression versus conservative treatment in acute biliary pancreatitis (APEC trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2016;17:5.

91. da Costa DW, Bouwense SA, Schepers NJ, et al.
Same-admission versus interval cholecystectomy for mild gallstone pancreatitis (PONCHO): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2015;386(10000):1261-8.
92. Moran RA, Jalaly NY, Kamal A, et al.
Ileus is a predictor of local infection in patients with acute necrotizing pancreatitis. Pancreatology 2016;16(6):966-72.
93. Zhu Y, Yin H, Zhang R, et al.
Nasogastric nutrition versus nasojejunal nutrition in patients with severe acute pancreatitis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Gastroenterol Res Pract 2016;2016:6430632.
94. Buxbaum JL, Quezada M, Da B, et al.
Early aggressive hydration hastens clinical improvement in mild acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 2017;112(5): 797-803.
95. ASGE Standards of Practice Committee, Maple JT, Ben-Menachem T, et al.
The role of endoscopy in the evaluation of suspected choledocholithiasis. Gastrointest Endosc. 2010;71:1-9.
96. Kapoor K, Repas K, Singh VK, et al.
Does the duration of abdominal pain prior to admission influence the severity of acute pancreatitis? JOP 2013;14(2):171-5.
97. Vaughn VM, Shuster D, Rogers MAM, et al.
Early versus delayed feeding in patients with acute pancreatitis: a systematic review. Ann Intern Med 2017;166(12): 883-92.
98. Gurusamy KS, Belgaumkar AP, Haswell A, Pereira SP, Davidson BR.
Interventions for necrotizing pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev 2016;4:CD011383.
99. Wu LM, Pendharkar SA, Asrani VM, et al.
Effect of intravenous fluids and analgesia on dysmotility in patients with acute pancreatitis: a prospective cohort study. Pancreas 2017;46(7):858-66.
100. Degrate L, Bernasconi DP, Meroni P, et al.
Mild acute biliary pancreatitis: the timing of cholecystectomy should not exceed index admission. Minerva Chir 2017;72:383-90

101. Kamal A, Akhuemonkhan E, Akshintala VS, Singh VK, Kalloo AN, Hutfless SM.
Effectiveness of Guideline–Recommended Cholecystectomy to Prevent Recurrent Pancreatitis. Am J Gastroenterol 2017;112:503–10.
102. Young SH, Peng YL, Lin Xh, et al.
Cholecystectomy reduces recurrent pancreatitis and improves survival after endoscopic sphincterotomy. J Gastrointest Surg 2017;21:294–301.
103. El Boukili I, Boschetti G, Belkhodja H, Kepenekian V, Rousset P, Passot G.
Update: role of surgery in acute necrotizing pancreatitis. J Visc Surg 2017;154:413–20
104. Mowery NT, Bruns BR, MacNew H, et al.
Surgical management of pancreatic necrosis: a practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma. J Trauma Acute Care Surg 2017;83:316–27.
105. Navarro–Sanchez A, Ashrafian H, Laliotis A, Qurashi K, Martinez–Isla A.
Single–stage laparoscopic management of acute gallstone pancreatitis: outcomes at different timings. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2016;15:297–301.
106. El–Dhuwaib Y, Deakin M, David GG, Durkin D, Corless DJ, Slavin JP.
Definitive management of gallstone pancreatitis in England. Ann R Coll Surg Engl 2012;94:402–6.
107. Anderloni A, Galeazzi M, Ballarè M.
Early endoscopic ultrasonography in acute biliary pancreatitis: a prospective pilot study. World J Gastroenterol. 2015;21:10427–10434.
108. da Costa DW, Bouwense SA, Schepers NJ, et al.
Dutch Pancreatitis Study Group. Same–admission versus interval cholecystectomy for mild gallstone pancreatitis (PONCHO): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2015;386:1261–8.

قسم الطبيب

أقسم بالله العظيم

أن أراقب الله في مهنتي.

وأن أصون حياة الإنسان في كافة أطوارها في كل الظروف
والأحوال باذلاً وسعي في إنقاذها من الهلاك والمرض
والألم والقلق.

وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عورتهم، وأكتم سرهم.
وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلاً رعايتي الطبية للقريب والبعيد،
للصالح والطالح، والصديق والعدو.

وأن أثابر على طلب العلم، وأسخره لنفع الإنسان لا لأذاه.
وأن أوقر من علمني، وأعلم من يصغرنى، وأكون أخاً لكل زميل في المهنة الطبية
متعاونين على البر والتقوى.
وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلايتي، نقيّة مما يشينها تجاه
الله ورسوله والمؤمنين.

أطروحة رقم 30

سنة 2019

إلتهاب البنكرياس الصفراوي الحاد : التعليمات الجديدة ودور الجراحة

الأطروحة

قدمت ونوقشت علانية يوم 2019/02/07
من طرف

السيد : سليمان كندري روضي

المزداد في 04/16/1993 بمراكش

لنيل شهادة الدكتوراه في الطب

الكلمات الأساسية:

إلتهاب البنكرياس الحاد – الحصى الصفراوي – الجراحة – التطور

اللجنة

الرئيس

المشرف

الحكام

م.خلوقي

أستاذ في التخدير و الإنعاش .

ر.بن الخياط بنعمر

أستاذة مبرزة في طب الكلي .

س.علج

أستاذة مبرزة في أمراض الطب الإشعاعي

ي.نرجس

أستاذ مبرز في الجراحة العامة

السيد

السيد

السيدة

السيد